

NISSORUN

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

NISSORUN

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Άδειας: 1243

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Hexythiazox 10 % B/B
Βοηθητικές ουσίες 89,76% B/B

Βρέξιμη σκόνη (WP)

100gr



Premier Shukuroglou

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεκίστε να ξεπλένετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα οφθαλμίατρο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό αν νιώθει αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Πλύνετε το στόμα και καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματοτική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:
Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιούν τον παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.



Green Dot Κύπρου



B/NISSORUN/100G/CY/2

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδέσση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-75 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός με την έναρξη της προσβολής από την έκπτυξη των σφραγισμένων έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 51-81). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **1 εφαρμογή.
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα και Επιτραπέζια σταφύλια): **Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-75 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός από την έναρξη της προσβολής από την έκπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 33-81). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες.
ΤΟΜΑΤΕΣ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (Θερμοκλήσιου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 14-89). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **1 εφαρμογή.
ΤΟΜΑΤΕΣ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (Υπαίθρου): **Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 50 - 75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-75 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 14-89). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **1 εφαρμογή**.********

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ: ΑΓΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (Θερμοκλήσιου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 50-80 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-80 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 14-89). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **1 εφαρμογή.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ: ΑΓΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (Υπαίθρου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 50-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-75 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 14-89). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **1 εφαρμογή.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ: ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υπαίθρου και Θερμοκλήσιου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 50-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-75 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 14-89). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **1 εφαρμογή.
ΦΡΑΟΥΛΕΣ (Υπαίθρου και Θερμοκλήσιου): **Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*). Δόση 50-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-75 γρ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 14-89). Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: **1 εφαρμογή**.********

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Να χρησιμοποιείται προτού φθάσουν τα σκάρφα στο στάδιο του ακμαίου. 2) Επειδή το δρυν συστατικό έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια δύο μηνών, συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή τον χρόνο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Μηλιά, Αχλαδιά: **28 ημέρες**. Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα): **21 ημέρες**. [Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (B)], [Τομάτες, Μελιτζάνες (Y)], [Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Φράουλες (Y+Θ)]: **3 ημέρες**.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΎΓΙΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διακρίσιμη ανθεκτικότητα: **Ομάδα Τρόπου Δράσης: 10A**
Για μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται: - Εφαρμογή όλων των μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διακρίσιμης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των σκάρφων σε χαμηλά επίπεδα. - Επεμβάσεις όταν είναι απαραίτητο και στον κατάλληλο χρόνο, στακεύοντας στα πιο ευαίσθητα βιολογικά στάδια των σκάρφων, με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για το ωφέλιμο έντομο. - Εφαρμογή του NISSORUN στις εγκεκριμένες δόσεις και με πλήρη κάλυψη του φυλλώματος των φυτών. - Εναλλαγή του σκευάσματος με σκαραφεκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. - Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

Αριθ. Παρτίδας (Batch No):
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date):
βλέπε επί της συσκευασίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικό ενδύματα. "Να φοράτε γάντια και προστατευτική μάσκα με φίλτρο κατά τη διάρκεια της αναμίξης / φόρτωσης". "Να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής".

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.
SP1 Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: Στην καλλιέργεια της **μηλιάς** και της **αχλαδιάς** να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα ή **20, 15 ή 10 μέτρα** σε συνδυασμό με ακροψία μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%, 75% ή 90%**, αντίστοιχα.

Στην καλλιέργεια του **αμπελιού** να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων ή 5 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροψία μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.
Για τις **υπόλοιπες καλλιέργειες** να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή να χρησιμοποιείτε ακροψία μείωσης **50%** της διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

EUH401 Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



5 290770 005656

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22 81 53 53
Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:
Nisso Chemical Europe GmbH