



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 2845 (Έντυπο 05) ημερομηνίας 24/06/2016 για ανανέωση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την επιστολή του αιτητή για ανανέωση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για ανανέωση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

ανανεώνεται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NINJA 1,5CS with Zeon Technology με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3095

Ημερομηνία ανανέωσης άδειας:

04/04/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas AEBE
Λεωφόρος Ανθούσας
Ανθούσα Αττικής 15349
Ελλάδα

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Ninja 1,5CS with Zeon technology

2. Μορφή: Εναιώρημα μικροκαψυλίων (CS)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Lambda – cyhalothrin: 1,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 98,36% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Syngenta Chemicals BV, Βέλγιο

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα, Ελλάδα
2. Syngenta Chemicals BV, Seneffe, Βέλγιο

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100 κ.εκ. έως 1 λίτρο	PET, HDPE, HDPE/PA
2	Δοχείο	1 λίτρο έως 20 λίτρα	f-HDPE, HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Lambda - cyhalothrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 90% (β/β)min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: 1. Youth Chemical Co. Ltd., Jiangsu, Κίνα
2. Syngenta Limited, Huddersfield, Ηνωμένο Βασίλειο
3. Bharat Rasayan Limited, Gujarat, Ινδία
4. Youjia Crop Protection Co. Ltd, Jiangsu, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το σκεύασμα, είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

Δρα διά επαφής και διά στομάχου επιδρώντας στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na^+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος διαφόρων καλλιεργειών και δολωματικός ψεκασμός στην ελιά.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη.

Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. / 100λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ./δεκ.		
Μηλιά MABSD	Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter</i> sp.- 1PRYCG)	-	100-150	67	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1
	Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (<i>Spodoptera frugiperda</i> – LAPHFR)					
Αχλαδιά PYUCO	Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter</i> sp.- 1PRYCG)	-	100 – 150	67	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-87).	1
	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i> – PSYLPI)					
Ροδακινιά PRNPS	Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (<i>Spodoptera frugiperda</i> – LAPHFR)	-	100 – 150	67	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1
	Φυλλοδέτης (<i>Adoxophyes orana</i> – CAPURE)					

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> – POLYBO) Κοχυλίδα (<i>Euroecilia ambiguaella</i> – CLYSAM) Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπετρα* (<i>Spodoptera frugiperda</i> – LAPHFR)	67	100	67	ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστοφόρων οφθαλμών έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89).	1
Ελιά OLVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> – PRAYOL) Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπετρα* (<i>Spodoptera frugiperda</i> – LAPHFR)	-	200	67	ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών και την εκκόλαψη των ωών από το στάδιο όπου τα εξωτερικά μικρά φύλλα ανοίγουν και διασταυρώνονται κοντά στην κορυφή τους έως ότου ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους ξεκινάει η σκλήρυνση του πυρήνα) (BBCH 09-75).	1
	Δάκος (<i>Bactrocera oleae</i> – DACUOL)	834	3 (Εφαρμογή 300 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού/ δέντρο. Μέγιστος αριθμός ψεκασμένων δέντρων ανά δεκάριο: 10)	25	Δολωματικοί ψεκασμοί από εδάφους σε συνδυασμό με ENTOMELA 75 SL ή DACUS BAIT 100 στις εγκεκριμένες δόσεις, σύμφωνα με τις συλλήψεις ακμαίων στις δακοπαγίδες. Να εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια κάθε 2 ^{ου} δέντρου του ελαιώνα.	2 / 14 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) LYPES Μελιτζάνα (Υπαίθρου &	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Δορυφόρος (<i>Lepidotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες	Υπαίθρου: 67 -134 Θερμοκηπίου: 45-134	Υπαίθρου: 50 – 100 Θερμοκηπίου: 50 – 150	67	ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδόνων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89).	1

Θερμοκηπίου) SOLME Πιπεριά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) CPSAN	(<i>Myzus persicae</i> – MYZUPE) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. – SPODSP)						
Αγγούρι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) CUMSA Κολοκύθι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) CUUPG	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> – MYZUP) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. – SPODSP)	Υπαίθρου: 50 – 100 Θερμοκηπίου: 50 – 150	Υπαίθρου: 67 -134 Θερμοκηπίου: 45-134	67	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδώνων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89).	1	
Λάχανο (Κραμπί) BRSOX Μπρόκολο BRSOK	Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i> –PIERBR) Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i> – BARABR) Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (<i>Spodoptera frugiperda</i> – LAPHFR)	50-100	67-134	67	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδώνων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-49).	1	
Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> - HELIA) Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i> – PECTGO) Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (<i>Spodoptera frugiperda</i> – LAPHFR)	50-80	-	100	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδίων (BBCH 60-81).	1	

	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> – APHIGO, <i>Myzus</i> sp. – MYZUSP)					Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος από το στάδιο της εμφάνισης του 1 ^{ου} πρώτου αληθινού φύλλου έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδιών (BBCH 11-81).	
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Χρήση ήσσονος σημασίας: Σποντόπτερα* (<i>Sporoptera frugiperda</i> – LAPHFR)	-	50-80	67	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλυδόνων στην επιφάνεια έως τη συγκομιδή (BBCH 09-49).	1	
Παρατηρήσεις: 1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά. * «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του <i>Sporoptera frugiperda</i> στις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, του αμπελιού, της ελιάς, του λάχανου (κραμπί), του μπρόκολου, του βαμβακιού και της πατάτας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».							

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Πατάτα, Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη), Μπρόκολο, Αγγούρι (Υ), Κολοκύθι (Υ)	7 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριές, Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Λάχανο (κραμπί)	3 ημέρες
Βαμβάκι, Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)	14 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με επινώπιους ψεκαστήρες σε αγρό και θερμοκήπιο.
- Επιτρέπεται η εφαρμογή με χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός (αυλός), μόνο στις καλλιέργειες χαμηλού ύψους ανάπτυξης και στο δολωματικό ψεκασμό στην ελιά.
- Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - IRAC: lambda-cyhalothrin: 3

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- Η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Για τον έλεγχο εχθρών υψηλού κινδύνου, να εφαρμόζεται το σκεύασμα σε προγράμματα ελέγχου που περιλαμβάνουν χημικές και βιολογικές μεθόδους, ωφέλιμα έντομα, καλλιεργητικές πρακτικές, εντομοελκυστικά κ.α.
- Χρήση καλλιεργητικών πρακτικών ή και πρακτικών βιολογικού ελέγχου.
- Χρήση ανθεκτικών ή πρώιμων ποικιλιών ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων.
- Να ρυθμίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής και να χρησιμοποιείται τις προτεινόμενες πιέσεις και δόσεις ψεκαστικού διαλύματος.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Η επανείσοδος στον αμπελώνα επιτρέπεται μόνο αφού περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος φορώντας γάντια.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- EUH208** Περιέχει Lambda-cyhalothrin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Υπαίθριες καλλιέργειες:

- Κατά την εφαρμογή **με τρακτέρ** φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- Κατά τη χρήση ψεκαστικού μηχανήματος **με εκτόξευση υποβοηθούμενη από ρεύμα αέρος (τουρμπίνα)**, πρέπει να χρησιμοποιείται τρακτέρ με κλειστή καμπίνα και ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50%.
- Να πραγματοποιείται εφαρμογή με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) μόνο σε χαμηλού ύψους καλλιέργειες στον αγρό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώτιου ψεκαστήρα στον αγρό.
- Σε περίπτωση επανεισόδου στη καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

- Κατά τον δολωματικό ψεκασμό στην καλλιέργεια της ελιάς με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός):

- φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2) κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.
- όταν η καλλιέργεια γεινιάζει με κατοικημένη περιοχή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώτιων ψεκαστήρων

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες:

- Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες χαμηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχο παντελόνι, σακάκι από βαμβάκι/πολυέστερα και γάντια
- Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες υψηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση επανεισόδου στο θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:

- **Σε μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά:** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **25 μέτρων**, εκ των οποίων τα **20 μέτρα** να είναι ζώνη φυτικής ανάσχεσης και με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **90%**.
- **Σε αμπέλι – πρώιμη εφαρμογή:** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων**, εκ των οποίων **20 μέτρα** ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **50%**.
- **Σε αμπέλι – όψιμη εφαρμογή:** Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **90%**.
- **Σε ελιά:** Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **90%**.
- **Σε βαμβάκι:** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **75%**.
- **Σε λοιπές καλλιέργειες υπαίθρου (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι, λάχανο (κραμπί), μπρόκολο):** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **40 μέτρων** εκ των οποίων **20 μέτρα** ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **50%**.
- **Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι):** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **40 μέτρων**, εκ των οποίων **20 μέτρα** ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφήσετε μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης **20 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά **50%**.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους:

- **Σε δένδρως καλλιέργειες:** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **90%**.
- **Σε τομάτα, μελιτζάνα και αγγούρι με ύψος >50 εκ. και αμπέλι:**
Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **60%** ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά **90%**.
- **Σε βαμβάκι:** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **70%**.
- **Σε λοιπές καλλιέργειες υπαίθρου με ύψος <50 εκ (τομάτα, μελιτζάνα, αγγούρι, πατάτα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, λάχανο, μπρόκολο):** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **30%**.
- **Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου με ύψος >50 εκ.:** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **90%**.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ζιζάνια σε ανθοφορία (απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους). Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Πολύ τοξικό σε βομβίνους και άλλους επικονιαστές που χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, καλέστε έναν γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν να τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Καλέστε ιατρική βοήθεια αν χρειάζεται.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Συμπτώματα: Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα παραισθησίας (φαγούρα, τσούξιμο, κάψιμο ή μούδιασμα του εκτεθειμένου δέρματος) τα οποία είναι παροδικά και διαρκούν έως 24 ώρες.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το MSDS. Μη προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό έως 2 (δύο) χρόνια στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 04/05/2025.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 04/10/2025.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 04/10/2025, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 04/04/2025



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας