



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4661 (Έντυπο 04) για χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο υποβλήθηκε επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το πανομοιότυπο αδειοδοτημένο προϊόν Coragen 20SC με αριθμό άδειας 2810,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν EMERGENT 200 SC με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4096

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

26/04/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Emergent 200 SC

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

chlorantraniliprole: 20% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 81,6% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC international Switzerland Sarl, Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. FMC Quimica Do Brazil Ltda, Βραζιλία
2. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
3. E. I. DuPont India Pvt. Ltd, Ινδία
4. Corteva Agriscince LLC, ΗΠΑ
5. Phyteurop, Γαλλία
6. FMC Corporation Σιγκαπούρη
7. Helena Industries, Inc. - (Toller), ΗΠΑ
8. FMC Corporation Agricultural Products Group, ΗΠΑ
9. Cheminova Deutschland GmbH & Co Kg, Γερμανία
10. Kwizda Agro GmbH, Αυστρία
11. Cheminova Agro France S.A.S, Γαλλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαλλία
2. Chemcopack NV, Βέλγιο
3. Laboratoire Didier Varenne, Γαλλία
4. Chemark Zft, Ουγγαρία
5. Cheminova Deutschland GmbH & Co Kg, Γερμανία
6. Kwizda Agro GmbH, Αυστρία
7. Cheminova Agro France S.A.S, Γαλλία
8. STI Solfotecnica Italian SPA, Ιταλία
9. Phyteurop SA., Γαλλία
10. Althaller Italia s.r.l., Ιταλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	50κ.εκ., 100κ.εκ., 150κ.εκ., 200κ.εκ., 250κ.εκ., 300κ.εκ., 500κ.εκ., 600κ.εκ., 900κ.εκ. και 1Λ	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: chlorantraniliprole

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: FMC international Switzerland Sarl, Ελβετία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. FMC Corporation, ΗΠΑ
2. E. I. Du Pont de Nemours and Company, ΗΠΑ
3. FMC (Shanghai) Agricultural Sciences Co Ltd., Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το EMERGENT 200 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προνυμφοκτόνο δράση για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτέρων και ορισμένων κολεόπτρων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες. Καταπολεμά όλα τα προνυμφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακμαίων σε ορισμένα έντομα. Επίσης επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυμφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο στο 1/4 ή στο 1/2 με νερό. Προσθέστε EMERGENT 200 SC απευθείας στο βυτίο. Αναδεύστε καλά ώστε το EMERGENT 200 SC να αναμειχθεί πλήρως με το νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε την ίδια μέρα.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε 3 φορές σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα.

Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Κ.Ε.Κ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	Κ.Ε.Κ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Μηλοειδή Μηλιά Αχλαδιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i> , (<i>Cydia molesta</i>) Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Agryotaenia pulchellana</i> , <i>Pandemis</i> spp) <i>Opherophtera brumata</i> Οστρίνια (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera frugiperda</i> **	16 – 20	70 – 150	30	BVCH 71-87 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαιολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 12 – 14 ημέρες.	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12 – 14 ημέρες
	Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorychter blaucardella</i> , <i>Ph. corylifoliella</i> & <i>Leucoptera scitella</i>)	16 – 18	70 – 150	27	Για τους φυλλορύκτες συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Επανάληψη μετά από 14 ημέρες. Ελάχιστη δόση /δεκάριο: 16κ.εκ	
	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i> <i>Agryotaenia pulchellana</i>)	16 – 20	70 – 150	30	BVCH 73-87 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαιολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών	
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά						2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες

	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Χρυσοκάνθαρος (<i>Anomalla vitis</i>)** <i>Spodoptera frugiperda</i> **				και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 10 – 12 ημέρες.	
	Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>)	18 – 20				
Δαμασκηινιά	Γκραφολίτα (<i>Cydia funebrana</i>) (<i>Opherophthera brumata</i>)				Δαμασκηινιά: BBCH 73-87 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαιολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπώδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους & επανάληψη μετά από 10 – 14 ημέρες. Για την <i>Opherophthera brumata</i> Εφαρμογή με την εμφάνιση των προνυμφών <u>Ελάχιστη δόση /δεκάριο: 16κ.εκ</u> Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 14 ημέρες
	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Χρυσοκάνθαρος** (<i>Anomalla vitis</i>) <i>Spodoptera frugiperda</i> **	16 – 20	70 – 150	30		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά Μανταρινιά Λεμονιά Σατσούμα Γκρέιπ φρουτ	Φυλλοκνίστης (<i>P. citrella</i>) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **	10 – 15	10 – 50	7,5	BBCH 31 - 50 Να χρησιμοποιηθεί πριν τα δένδρα εισέλθουν σε παραγωγική ηλικία Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Επανάληψη μετά από 10 – 12 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές <u>Ελάχιστη δόση /δεκάριο: 5 κ.εκ.</u>	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες
Καρυδιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **	18 – 20	100 – 150	30	BBCH 73-87 Εφαρμογές όταν ξεκινά η διόγκωση των περικαρπίων έως το στάδιο όπου το 70% έχει ωριμάσει. (BBCH 73-87). Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες

Καστανιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i> , <i>Cydia fagiglandan</i>) Κολεόπτερα (σκαθάρι) (<i>Curculio elephas</i>) Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> **	18 – 20	100 – 150	30	Επανάληψη μετά από 10 – 12 ημέρες. Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του <i>Ragoletis completa</i> . <u>Ελάχιστη δόση /δεκάριο:</u> 18 κ.εκ	
	Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> **	18 – 20	100 – 150	30		
Αμυγδαλιά	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Κογχυλιδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>) <i>(Argyrotaenia pulchellana)</i> Χρήση ήσσονος σημασίας: <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> **	15 – 18	50 – 150	27	BBCH 57-83 Λίγο πριν την ανθοφορία έως τον χρωματισμό του μούρου Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. <u>Ελάχιστη δόση /δεκάριο</u> 15 κ.εκ	1 εφαρμογή
			50 – 120	21,6	BBCH 57-85 Λίγο πριν την ανθοφορία έως το ΡΗΙ Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες <u>Ελάχιστη δόση /δεκάριο</u> 15 κ.εκ	
Πατάτα	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	----	30 – 80	5 – 6	BBCH 31-69 (έως την ολοκλήρωση της άνθησης της 1 ^{ης} ανθοφορίας) Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες διαβρώσεις. Επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες. Η μεγάλη	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 – 21 ημέρες

	Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i>					δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές	
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **	12,5 – 17,5				BBCH 31- 93 (έως το κιτρίνισμα των φύλλων) Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την αναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες πτήσεις ακμαίων. Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές	
Καλαμπόκι Γλυκό καλαμπόκι	Πυραλίδα (<i>O. nubilalis</i>) Σεζάμια (<i>Sesamia spp.</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>H. armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>S. exigua</i>) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **	30 – 80	10 – 15	----		T1=BBCH 14 - 55 T2=BBCH 73 - 87 Πρώτη εφαρμογή από το 4 ^ο φύλλο μέχρι την έκπτυξη του κορυφαίου θυσάνου. Δεύτερη εφαρμογή από το στάδιο της ανάπτυξης των σπόρων έως λίγο πριν την ωρίμανση Ελάχιστη δόση εφαρμογής 10 κ.εκ/δεκάριο	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 30 ημέρες
Βαμβάκι	Σποντόπτερα (<i>S. exigua</i>) <i>S. littoralis</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>H. armigera</i>) Ακανθώδες σκουλήκι (<i>Earias spp</i>) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **	30 – 80	20	---		BBCH 34-77 Εφαρμογές από το στάδιο όπου το 40% των φυτών συναντιούνται μεταξύ των γραμμών έως το 70% των καψών να έχει αποκτήσει το τελικό μέγεθος Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες	2 με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες

<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Καπνός *	Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>H. armigera</i>) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **	---	100 – 150	17,5	Κατά την εναπόθεσή των αυγών ή με τις πρώτες πτήσεις των ακμαίων.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 – 12 ημέρες
<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Κυδωνιά *	Καρτόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) (<i>Cydia molesta</i>) Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i>, <i>Agryotaenia pulchellana</i>, <i>Pandemis</i> spp) <i>Opherophtera brumata</i> Οστρίνια (<i>Ostrinia nubilalis</i>) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> **	16 – 20	70 – 150	30	BBSCH 71-87 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12 – 14 ημέρες
Παρατηρήσεις:	Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorychter blancardella</i>, <i>Ph. corylifoliella</i>, <i>Leucoptera scitella</i>)	16 – 18		27	Για τους φυλλορύκτες συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Ελάχιστη δόση /δεκάριο 16 κ.εκ	

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του καπνού και της κυδωνιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του Χρυσοκάνθαρου (*Anomala vitis*) στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς, δαμασκηνιάς και κατά του *Spodoptera frugiperda* σε όλες τις καλλιέργειες. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Μηλοειδή	14 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	30 ημέρες (οινοποιήσιμο) 3 ημέρες (επιτραπέζιο)
Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Βαμβάκι	21 ημέρες
Καλαμπόκι, Γλυκό Καλαμπόκι	7 ημέρες
Πατάτα	14 ημέρες
Εσπεριδοειδή	Μη εφαρμόσιμο
<i>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας</i>	
Κυδωνιά	14 ημέρες
Καπνός	1 ημέρα

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: chlorantraniliprole: 28

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών.
2. Οι εφαρμογές να γίνονται με την συνιστώμενη δόση και να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
3. Το EMERGENT 200 SC να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
4. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
5. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας

- Να αποφεύγεται η χρήση του σε καλλιέργειες υπό στρές.
- Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμμώδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό υδροφόρο ορίζοντα)
- Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
- Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό

Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα .
Συστήνεται να γίνεται δοκιμή μικρής κλίμακας του υπό παρασκευή μίγματος βυτίου και να αποφεύγονται μίγματα βυτίου με πολλά σκευάσματα. Το EMERGENT 200 SC δεν είναι συμβατό με παρασκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τα πυρηνόκαρπα (εκ των οποίων 10 μέτρα με βλάστηση), **10 μέτρων** για τα οπωροφόρα δέντρα και **5 μέτρων** για το αμπέλι.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Το EMERGENT 200 SC δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση επαφής συστήνεται η καλή πλύση με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Το EMERGENT 200 SC δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Αν ωστόσο υπάρξει επαφή ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν χρειαστεί, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε άμεσα, ιατρική συμβουλή

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Περιέχει 1,2 βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποφύγετε την μακρά έκθεσή του σε θερμοκρασία μικρότερη των 0°C, ή μεγαλύτερη των 40°C.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.


Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 26/04/2024



Σφραγίδα


(Δρ Μάκης Αντωνιάδης)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας