



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 4721 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 17/09/2024, για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για χορήγηση άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **RIDOMIL GOLD 465.2 SL**.....με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4148

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

14/02/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/05/2036

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Ridomil Gold 465.2 SL

2. Μορφή: Διαλυτό συμπύκνωμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: metalaxyl-m 46,52 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 52,2 % (β/β)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Chemark ZRT, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία
2. Schirm GmbH, Schönebeck, Γερμανία
3. Syngenta Chemicals B.V., Seneffe, Βέλγιο
4. Syngenta South Africa (Pty) Limited, Brits, N. Αφρική
5. Syngenta Crop Protection AG, Munchwilen, Ελβετία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Chemark ZRT, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία
2. Schirm GmbH, Schönebeck, Γερμανία
3. Syngenta Chemicals B.V., Seneffe, Βέλγιο
4. Syngenta South Africa (Pty) Limited, Brits, N. Αφρική
5. Syngenta Crop Protection AG, Munchwilen, Ελβετία
6. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	100 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE, HDPE/PA
2.	Δοχείο	5 λίτρα	HDPE, f- HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Metalaxyl-m

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

92% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Ελβετία

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

CABB AG, Pratteln, Ελβετία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση κατά του περονόσπορου σε καλλιέργειες αμπέλου, κηπευτικών και πατάτας.

Το metalaxyl-m είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται ακροπεταλικά προστατεύοντας την νέα βλάστηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση με μεγάλη διάρκεια δράσης και ανθεκτικότητα στη διαβροχή. Εμφανίζει και θεραπευτική δράση.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες

☐

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα διεξοδικά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ 10.000 m ² φυλλικής επιφάνειας (LWA)*	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) (VITVI)	Περνόςπορος <i>Plasmopara viticola</i> (PLASVI)	120	20-100	20	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 15-81)	1-2 / 7-10
Τομάτα (Υ) (LYPES)	Περνόςπορος <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)	--	30-100	20	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή (BBCH 15-84)	1-2 / 7-10
Μπρόκολο (Υ) (BRSOK) Κουνουπίδι (Υ) (BRSOB)	Περνόςπορος <i>Hyaloperonospora brassicae</i> (HPERBR)	--	20-80	20	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου οι κεφαλές αποκτήσουν το τυπικό τους σχήμα και μέγεθος (BBCH 11-49)	1
Μαρούλι (Υ) (LACSA)	Περνόςπορος <i>Bremia lactucae</i> (BREMLA)	--	20-80	20	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το φυτό αποκτήσει το τυπικό του μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49)	1

Αντίδι (Υ) (CICEN) Λυκοτρίβολο (Υ) (VLLLO)	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> (BREMLA)	--	20-80	20	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το φυτό αποκτήσει το τυπικό του μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49)	1
Βότανα και βρώσιμα άνηθ (Υ): - Βασιλικός (Υ) (OCIBA) - Θυμάρι (Υ) (THYVU) - Σχοινόπρασο (Υ) (ALLSC)	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> (BREMLA)	--	20-80	20	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού έως όπου η φυλλική μάζα να φτάσει το τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49)	1
Αγγούρι (Υ) (CUMSA)	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> (PSPECU)	--	20-100	20	Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 13-81)	1
Αγγούρι (Θ) (CUMSA)	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> (PSPECU)	100	20-100	20	Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή (13-81)	1-2 / 7-10
Πεπόνι (Υ) (CUMME)	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> (PSPECU)	--	20-100	20	Από εμφάνιση της πρώτης πλάγιας βλάστησης έως την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 21-81)	1-2 / 7-10

Πεπόνι (Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ+Θ) (CITLA)	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> (PSPECU)	--	20-100	20	Από εμφάνιση της πρώτης πλάγιας βλάστησης έως την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 21-81)	1-2 / 7-10
Κρεμμύδι (ξηρό) (ALLCE)	Περονόσπορος <i>Peronospora destructor</i> (PERODE)	--	20-80	20	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου έως οι βολβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 15-49)	1
Πατάτα (SOLTU)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)	--	30-60	20	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} φύλλου έως το φυτό αποκτήσει το τυπικό του μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49)	1-2 / 7-10

Παρατηρήσεις:

Η χρήση στο **θυμάρι** περιλαμβάνει και την δευτερεύουσα χρήση στη **ρίγανη**.

Η χρήση στον **βασιλικό** περιλαμβάνει και τις δευτερεύουσες χρήσεις στη **μέντα** και τον **δυόσμο**.

Η χρήση στην καλλιέργεια του **μαρουλιού** αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις: **Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια**.

1. Για αύξηση της αποτελεσματικότητας στην καλλιέργεια του **κρεμμυδιού**, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικό παράγοντα.

*Δόση LWA:

Σε γραμμικά συστήματα φύτευσης/ καλλιέργειας κάθετης ανάπτυξης, για την εφαρμογή της βέλτιστης δόσης σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, να γίνεται υπολογισμός της δόσης ανά δεκάριο λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της καλλιέργειας (ύψος βλάστησης και απόσταση μεταξύ των γραμμών) και τη δόση LWA ως εξής:

Τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο= (LWA/100.000) x Δόση LWA (από τον ανωτέρω πίνακα), όπου LWA= 2 x [ύψος βλάστησης (μέτρα) x 10.000/ απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)]

Για το **αμπέλι**: Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σταύρωμα μέχρι την κορυφή της βλάστησης. Η δόση LWA είναι σταθερή (120 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 20 κ.εκ. ανά δεκάριο.

Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά δεκάριο:

		Ύψος βλάστησης (μέτρα)							
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5
	2,5	5	7	10	14	19	20	20	20
	3	4	6	8	12	16	20	20	20
	3,5	3	5	7	10	14	17	20	20
	4	3	5	6	9	12	15	18	20
	4,5	3	4	5	8	11	13	16	19

Για το αγγούρι θερμοκηπίου:

Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σημείο έκπτυξης της βλάστησης ή καρποφορίας μέχρι την κορυφή της βλάστησης.
Η Δόση LWA είναι σταθερή (100 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 20 κ.εκ. ανά δεκάριο.

Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά δεκάριο για την τομάτα θερμοκηπίου.

		Ύψος βλάστησης (μέτρα)							
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5
	2,5	4	6	8	12	16	20	20	20
	3	3	5	7	10	13	17	20	20
	3,5	3	4	6	9	11	14	17	20
	4	3	4	5	8	10	13	15	18
	4,5	2	3	4	7	9	11	13	16

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας (ημέρες)
Αγγούρι (Υ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Τομάτα (Υ)	3
[Μαρούλι (Υ): Κατσαρά μαρούλια (Υ), Μαρούλια Σαλάτες (Υ), Κεφαλωτά μαρούλια (Υ), Κοινά μαρούλια (Υ), Αντίδι (Υ), Λυκοτρίβολο (Υ), Σχοινόπρασο (Υ), [Θυμάρι (Υ): Ρίγανη (Υ)], [Βασιλικός (Υ): Μέντα χνουδωτή (Υ), δυόσμος (Υ)]	10
Κρεμμύδι (ξηρό), Πατάτα, Αγγούρι (Θ)	14
Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οινοποιήσιμο, Κουνουπίδι (Υ), Μπρόκολο (Υ)	20

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - FRAC: metalaxyl-m: 4

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- Να εφαρμόζετε το σκεύασμα προληπτικά.
- Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικής ομάδας κατά FRAC).
- Να χρησιμοποιείται νωρίς ή στην περίοδο ανάπτυξης νέας βλάστησης.
- Να μην ξεπερνάτε τις 2-4 διαδοχικές εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν δ.ο. που ανήκουν στις φαινυλαμίδες ανά καλλιέργεια και ανά έτος. Τα μεσοδιαστήματα εφαρμογών να μην ξεπερνούν τις **14** ημέρες.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Η επανείσοδος για χειρωνακτική συγκομιδή, επιτρέπεται μόνο αφού περάσουν **2** ημέρες για τον αμπελώνα και **10** ημέρες για τις κράμβες από την εφαρμογή του σκευάσματος

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:


Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασμα RIDOMIL GOLD 465.2 SL πρέπει να χρησιμοποιείται **υποχρεωτικά** σε μίγμα βυτίου με τα παρακάτω εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα: ORTIVA 25 SC, REVUS 250 SC, FOLPET 80 WG (υπό συνεχή ανάδευση), LEIMAY και τους κλώνους αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί».

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος».

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».

«Φοράτε ολόσωμη αδιάβροχη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος, σε **θερμοκηπιακές καλλιέργειες υψηλής πυκνότητας**».

«Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά την εφαρμογή φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι».

«Σε υπαίθριες καλλιέργειες πυκνής φύτευσης, **δεν επιτρέπεται η χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός και επινώτιου ψεκαστήρα**».

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείτε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P301+P312+P330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό έως τρία (3) χρόνια στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 14/02/2025



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας