

ARMAGEDDON 20SL

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και σπράκουν, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μπεκτικών εντόμων καθώς και ραπτικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες.
Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Acetamiprid: 20 % β/α
Βοηθητικές ουσίες: 82,2 % β/β
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΔΛΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡ. ΔΛΕΙΑΣ : 3983-R

ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του ακευασμάτος ανά ανά με ανδοθήτωση σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανδουση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτί. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίκνη του ακευασμάτος. Ξεπλύνετε το βυτί και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο - τρεις (2 - 3) φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΙΔΗ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΑΙΜ, ΦΡΑΠΑ) για **Φυλλοκνίστα** με δόση 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 30 ημέρες. Για **Πράσινη αφίδα, Αφίδα βαρβακίου, Μαύρη αφίδα** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα/δ.εκ. υγρού ή 35 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 60-140 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 30 ημέρες. Για **Κόκκινη ψώρα, Παράτορία, Ψευδόκοκκο** με δόση 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 30 ημέρες.

ΜΗΛΟΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ) για **Φυλλορύκτες** με δόση 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 70-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 60 ημέρες. Για **Πράσινη αφίδα** με δόση 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 60 ημέρες. Για **Ρόδινη αφίδα, Αφίδα ακαλίου** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 60 ημέρες. Για **Καρπόκαυμα** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 60 ημέρες. Για **Ουλοκόμμη** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 60 ημέρες.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ για **Πράσινη αφίδα, Φυλλορύκτες, Τσιτζίκια** με δόση 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 55-80* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**. Για **Αφίδες** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 80 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**. Για **Καρπόκαυμα, Ανάστρο** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 40-55* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **1 εφωρμονή**. Για **Θρίπες** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 40-55* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**.

ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ για **Αφίδες, Φυλλορύκτες** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 20 ημέρες. Για **Καρπόκαυμα** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 20 ημέρες.

ΚΕΡΑΣΙΑ για **Ραγολέτες** με δόση 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 14 ημέρες. Για **Μαύρη Αφίδα** με δόση 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 14 ημέρες.

ΕΛΙΑ **Ελαιοποίηση** για **Πυρρνοτρίπη** με δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 14 ημέρες. Για **Δάκο** με δόση 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 14 ημέρες.

ΕΛΙΑ **Επιτραπέζια** για **Πυρρνοτρίπη** με δόση 45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. **1 εφωρμονή**. Για **Δάκο** με δόση 45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες. **1 εφωρμονή**.

ΑΜΠΕΛΙ (ΟΙΝΟΠΙΝΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ) για **Τσιτζίκια** με δόση 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 70-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**. Για **Ευδερίδα** με δόση 35-45* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 55-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός κάλυψης σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **1 εφωρμονή**.

ΒΑΜΒΑΚΙ για **Αφίδες, Καφέ βρωμούσα (Χρίστη ήσσονος σημασίας)**** με μέγιστη δόση 20 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 20 ημέρες.

ΛΟΠΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ BABY LEAF), ΚΑΡΔΑΜΟ, ΓΑΙΟΚΑΡΔΑΜΟ, ΡΟΚΑ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΙΝΑΠΙ για **Αφίδες (Nasonovia ribis-nigri)** με μέγιστη δόση 25-35 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**. Για **Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)** με μέγιστη δόση 20-25 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**.

ΠΑΤΑΤΑ για **Δορυφόρο** με μέγιστη δόση 10-15 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 40 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 7 ημέρες. Για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 20 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 7 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ (Υαίθρου) για **Πράσινη αφίδα** με δόση 20-25* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 20-25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**. Για **Αλευρώδεις** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 30 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 60-85* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**.

ΤΟΜΑΤΑ (Θερμοκηπίου) για **Πράσινη αφίδα** με δόση 20-25* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 20-25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**. Για **Αλευρώδεις** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υαίθρου & Θερμοκηπίου) για **Πράσινη αφίδα** με δόση 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 20-25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 20 ημέρες. Για **Αλευρώδεις** με δόση 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 35-50 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-170 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 20 ημέρες.

[ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΜΠΡΟΚΚΑΟ, ΛΑΧΑΝΟ] (Υαίθρου) για **Πλουτέλλα** με μέγιστη δόση 25-35 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφωρμονή**.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 25 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/δ.εκ. και για **Σκαθόρι της γύρης** με μέγιστη δόση 30 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφωρμονές** με μεσοδιάστημα εφωρμονής 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. 2. Μην φεκάσετε κατά την άνοδο των καλλιεργειών με εντομώφλη επικονίαση. 3. Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.κ./100 λιτ. ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά δεκάριο.

* Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο δεκάριο

** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ./δεκάριο), Βαμβάκι, Δαρσκακινά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Τοράτα (Υ): 14 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): 21 ημέρες. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιφ φρουτ) (δόση 150 κ.εκ./δεκάριο): 60 ημέρες. Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λίμυ, Φράπιο) (δόση 150 κ.εκ./δεκάριο): 30 ημέρες. Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): 10 ημέρες. Πατάτα, Μελιτζάνα (Υ), Ελιά ελαιολειψίμυ: 7 ημέρες. Επιτραπέζια ελιά: 28 ημέρες. Μελιτζάνα (Β), Τοράτα (Β), Κερασιά: 3 ημέρες. Ελαιοκράμβη: 20 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - HRAC: acetamiprid: 4A

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Να μη γίνει επανείσοδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:---



ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H361d Ύψατο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΥΗ 401 Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: K5CF-N9KK-UJAS-WADX

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό ο προϊόν. **P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. **P202** Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ενδύμα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. **ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ:** «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή.» **ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΟ:** «Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχο φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.» «Σε περίπτωση επανείσοδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκάσμα, φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια».

P501 Διάβετε τον περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λειοπτώσεις επιφανείας και τους δρόμους).

SPe3 Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφίσσετε από τα επιφανειακά ύδατα μια: • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** για εφαρμογή σε τομάτα, μελιτζάνα, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf). • φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** για εφαρμογή σε πατάτα, αμπέλι και ελαιοκράμβη. • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά. • φυτική ζώνη ανάσχεσης **15m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%**, σε δαρσκακινιά. • αφέκαστη ζώνη **30m** ή αφέκαστη ζώνη **20m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε κερασιά. • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m**, ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση). • αφέκαστη ζώνη **50m** με φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε εσπεριδοειδή (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση). • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε ελιά.

SPe3 Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη-στόχους** να αφίσσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργημένη γη: • **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή νωρίς), βερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά. • **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%** ή **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή αργά) και κερασιά. • **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο), δαρσκακινιά, μηλιά και αχλαδιά. • **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** σε τομάτα και μελιτζάνα. • **15m** ή **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε ελιά.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: P301+P330+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας. **P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε το πάθονα στο καθαρό αέρα και σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φεκοί επαφής αναρροήστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό. Πλύνετε τα πλυμασμένα ρούχα πριν τα αναρροήσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Στην αρχική του αλληλεπίδραση συσκευασίας, καλά κλειστά, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή (ένα νερό του ξεπλύματος τα ριχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΑΞ:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
Λευκωσία, Τηλ. + 357 22 81 53 53
www.premier.com.cy

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Nufarm Europe GmbH

LE/ARMAGEDDON/CY/6