

EMERGENT 200 SC[®]

(Chlorantraniliprole 20% β/ο)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Άδειας: 4096

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Chlorantraniliprole 20% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 81,6% β/β

Το **EMERGENT 200 SC** είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προνυμφοκτόνο δράση για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτέρων και ορισμένων κολεόπττερων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες. Καταπολεμά όλα τα προνυμφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακμαίων σε ορισμένα έντομα. Επίσης, επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυμφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη νυκτική λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

Κάτοχος της άδειας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ, Λεωφ. Συγγρού 348 Καλλιθέα 17674, ΤΗΛ.: 211 198 3903

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά-Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd,
Τηλ. 22815353, Λευκωσία, e-mail: contact@premier.com.cy,
www.premier.com.cy



Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποφύγετε την μακρά έκθεσή του σε θερμοκρασία μικρότερη των 0°C, ή μεγαλύτερη των 40°C.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Αριθ. Παρτίδας/
Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία



1 L
ΠΕΡΙΣΧΟΜΕΝΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: TAYW-M2TA-5N4P-4CN5

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P102+P405 ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. SP1: Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: · **20 μέτρων** για τα πυρηνόκαρπα (εκ των οποίων τα δέκα (10) μέτρα με βλάστηση) · **10 μέτρων** για τα οπωροφόρα δέντρα και · **5 μέτρων** για το αμπέλι.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Το **EMERGENT 200 SC** δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση επαφής συστήνεται η καλή πλύση με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Το **EMERGENT 200 SC** δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Αν ωστόσο υπάρξει επαφή ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν χρειαστεί, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε άμεσα, ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **Περιέχει 1,2 βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.** Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας. Ομάδα Τρόπου Δράσης: chlorantraniliprole: 28.

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών. 2. Οι εφαρμογές να γίνονται με την συνιστώμενη δόση και να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. 3. Το **EMERGENT 200 SC** να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 4. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδοχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 5. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. - Να αποφεύγεται η χρήση του σε καλλιέργειες υπό στρες. - Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμύδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό ορυφόρο ορίζοντα). - Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. - Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό. Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυντος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: ---

Φάσμα Δράσης: Πεδίο Εφαρμογής - Εχθρός που έλεγχεται - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ): Για Καρπόκαψα, Φυλλοδέστες, Οστρίνια, Χρήση ήσσονος σημασίας: *Spodoptera frugiperda* ** με δόση 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH71-87) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους, και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες. Για Φυλλορόκτες με δόση 16-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (27 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). Για τους φυλλορόκτες συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Επανάληψη μετά από 14 ημέρες. Ελάχιστη δόση/δεκάριο 16 κ.εκ. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12 -14 ημέρες.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Για Καρπόκαψα, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για Χρυσοκάνθαρος**, *Spodoptera frugiperda*** με δόση 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). Για Ανάρσας με δόση 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH 73-87) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους, και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Για Γκραφολίτα, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για Χρυσοκάνθαρος**, *Spodoptera frugiperda*** με δόση 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH 73-87) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους & επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Για την *Opherophthera brumata* εφαρμογή με την εμφάνιση των προνυμφών. Ελάχιστη δόση/δεκάριο 16 κ.εκ. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 -14 ημέρες.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΣΑΤΣΟΥΜΑ, ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ): Για Φυλλοκνίστη, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** με δόση 10-15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH 31-50) Να χρησιμοποιηθεί πριν τα δένδρα εισέλθουν σε παραγωγική ηλικία. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Ελάχιστη δόση/δεκάριο: 5 κ.εκ. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

ΚΑΡΥΔΙΑ: Για Καρπόκαψα, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** ΚΑΣΤΑΝΙΑ: Για Καρπόκαψα, Κολεόπτερα (σκαθάρι), Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda***, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Για Ανάρσας, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** με δόση 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH 73-87) Εφαρμογές όταν ξεκινά η διδγκωση των περικαρπίων έως το στάδιο όπου το 70% έχει ωριμάσει. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους. Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του *Rhagoletis*

completa. Ελάχιστη δόση/δεκάριο 18 κ.εκ. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ: Για Ευδεμίδα, Κογγυλίδα, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** με δόση 15-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (27 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH 57-83) Λίγο πριν την ανθοφορία έως τον χρωματισμό του μούρου. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Ελάχιστη δόση/δεκάριο 15 κ.εκ. 1 εφαρμογή.

ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ: Για Ευδεμίδα, Κογγυλίδα, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** με δόση 15-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (21,6 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH 57-85) Λίγο πριν την ανθοφορία έως το ΡΗΙ. Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Ελάχιστη δόση/δεκάριο 15 κ.εκ. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ: Για Δορυφόρο, με δόση 5-6 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. (BBCH 31-69) Έως την ολοκλήρωση της άνθησης της 1ης ανθοφορίας. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες διαβρώσεις. Επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Για Φθορμαία, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** με δόση 12,5-17,5 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. (BBCH 31-93) Έως το κίτρινισμα των φύλλων. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες πτήσεις ακμαίων. Επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Για Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** με δόση 10-15 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. (T1=BBCH 14-55, T2=BBCH 73-87) Πρώτη εφαρμογή από το 4^ο φύλλο μέχρι την έκπτυξη του κορυφαίου θυσάνου. Δεύτερη εφαρμογή από το στάδιο της ανάπτυξης των σπόρων έως λίγο πριν την ωρίμανση. Ελάχιστη δόση εφαρμογής 10 κ.εκ/δεκάριο. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-30 ημέρες.

BAMBAKI: Για Σποντόπτερα, Πράσινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Χρήση ήσσονος σημασίας: Για *Spodoptera frugiperda*** με δόση 20 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. (BBCH 34-77) Εφαρμογές από το στάδιο όπου το 40% των φυτών συναντιούνται μεταξύ των γραμμών έως το 70% των καψών να έχει αποκτήσει το τελικό μέγεθος. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

ΚΥΔΩΝΙΑ* (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για Καρπόκαψα, Φυλλοδέστες, Οστρίνια, *Spodoptera frugiperda* με δόση 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). (BBCH 71-87) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καρπών, από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψη τους, και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες. Για Φυλλορόκτες με δόση 16-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (27 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη). Για τους φυλλορόκτες συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα. Η μεγάλη δόση να χρησιμοποιείται σε μεγάλες προσβολές. Ελάχιστη δόση/δεκάριο 16 κ.εκ. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12-14 ημέρες.

ΚΑΠΝΟΣ* (Χρήση ήσσονος σημασίας): Για Φθορμαία, Πράσινο σκουλήκι, *Spodoptera frugiperda* με δόση 17,5 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. Κατά την εναπόθεση των αυγών ή με τις πρώτες πτήσεις των ακμαίων. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/δεκ.: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Ροδακινιά, Νεκταρινιά Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κυδωνιά: **70-150**. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Σατσούμα, Γκρέιπ φρούτ: **10-50**. Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Καπνός: **100-150**. Αμπέλι οينوποιήσιμο: **50-150**. Αμπέλι επιτραπέζιο: **50-120**. Πατάτα, Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι, Βαμβάκι: **30-80**.

Παρατηρήσεις: *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του καπνού και της κυδωνιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. **Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του Χρυσοκάνθαρου (*Anomala vitis*) στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς, δαμασκηνιάς και κατά του *Spodoptera frugiperda* σε όλες τις καλλιέργειες. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Πατάτα, Κυδωνιά: **14 ημέρες**. Αμπέλι (επιτραπέζιο): **3 ημέρες**. Αμπέλι (οينوποιήσιμο): **30 ημέρες**. Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Βαμβάκι: **21 ημέρες**. Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Σατσούμα, Γκρέιπ φρούτ: **Μη εφαρμόσιμο**. Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι: **7 ημέρες**. Καπνός: **1 ημέρα**.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευασθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις γερçekριμένες καλλιέργειες και στις συνιστούμενες δόσεις εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο στο 1/4 ή στο 1/2 με νερό. Προσθέστε **EMERGENT 200 SC** απ' ευθείας στο βυτίο. Αναδεύστε καλά ώστε το **EMERGENT 200 SC** να αναμειχθεί πλήρως με το νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια του ψεκασμού. Ψεκάστε την ίδια μέρα.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Συστήνεται να γίνεται δοκιμή μικρής κλίμακας του υπό παρασκευή μίγματος βυτίου και να αποφεύγονται μίγματα βυτίου με πολλά σκευάσματα. Το **EMERGENT 200 SC** δεν είναι συμβατό με παρασκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

EMERGENT 200 SC[®]

(Chlorantraniliprole 20% β/ο)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Άδειας: 4096

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγραμμένη σύνθεση: Chlorantraniliprole 20% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 81,6% β/β

Το **EMERGENT 200 SC** είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προνυμφοκτόνο δράση για την καταπολέμηση των πιο διαδεδομένων λεπιδοπτερών και ορισμένων κολεόπτερων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες. Καταπολεμά όλα τα προνυμφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακμαίων σε ορισμένα έντομα. Επίσης, επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυμφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

Κάτοχος της άδειας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ, Λεωφ. Συγγρού 348 Καλλιθέα 17674, ΤΗΛ.: 211 198 3903

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά-Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd,
Τηλ. 22815353, Λευκωσία, e-mail: contact@premier.com.cy,
www.premier.com.cy



Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Αποφύγετε την μακρά έκθεσή του σε θερμοκρασία μικρότερη των 0°C, ή μεγαλύτερη των 40°C.



Αριθ. Παρτίδας/
Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

1 L
ΠΕΡΙΣΧΟΜΕΝΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: TAYW-M2TA-5N4P-4CNS

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P102+P405 ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. SP1: Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: · **20 μέτρων** για τα πυρηνόκαρπα (εκ των οποίων τα δέκα (10) μέτρα με βλάστηση) · **10 μέτρων** για τα οπωροφόρα δέντρα και · **5 μέτρων** για το αμπέλι.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Το **EMERGENT 200 SC** δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση επαφής συστήνεται η καλή πλύση με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Το **EMERGENT 200 SC** δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Αν ωστόσο υπάρξει επαφή ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν χρειαστεί, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε άμεσα, ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **Περιέχει 1,2 βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.** Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: chlorantraniliprole: 28.

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών. 2. Οι εφαρμογές να γίνονται με την συνιστώμενη δόση και να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. 3. Το **EMERGENT 200 SC** να εφαρμόζεται μέχρι 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 4. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδοχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 5. Εάν διαπιστωθούν επιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. - Να αποφεύγεται η χρήση του σε καλλιέργειες υπό στρες. - Να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά εδάφη (αμύδη, οργανική ουσία <2%, υψηλό ορυφόρο ορίζοντα). - Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. - Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό. Κατά την περίοδο ανθοφορίας των καλλιεργειών να μην εφαρμόζεται το προϊόν κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονιαστές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυντος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: ---

