

Ridomil Gold 465.2 SL

Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση κατά του περονόσπορου σε καλλιέργειες αμπέλου, κηπευτικών και πατάτας.

Το metalaxyl-m είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση κατά των ωομυκήτων που κινείται ακροπεταλικά προστατεύοντας την νέα βλάστηση παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση με μεγάλη διάρκεια δράσης και ανθεκτικότητα στη διαβροχή. Εμφανίζει και θεραπευτική δράση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

metalaxyl-m 46,52 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 52,2 % β/β

Διαλυτό συμπύκνωμα (SL)

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 4148

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα διεξοδικά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για **Περονόσπορο** (*Plasmopara viticola*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη ή 120 κ.εκ./10.000 m² φυλλικής επιφάνειας (LWA)*. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 15-81). **1-2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ (Y): Για **Περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου έως την συγκομιδή (BBCH 15-84). **1-2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

ΜΠΡΟΚΟΛΟ (Y), ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (Y): Για **Περονόσπορο** (*Hyaloperonospora brassicae*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 20-80 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 1^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου οι κεφαλές αποκτήσουν το τυπικό τους σχήμα και μέγεθος (BBCH 11-49). **Μία (1) εφαρμογή.**

ΜΑΡΟΥΛΙ (Y), ΑΝΤΙΔΙ (Y), ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (Y): Για **Περονόσπορο** (*Bremia lactucae*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 20-80 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως το φυτό αποκτήσει το τυπικό του μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49). **Μία (1) εφαρμογή.**

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΑ ΑΝΘΗ (Y): Βασιλικός (Y), Θυμαρί (Y), Σχοινόπρασο (Y): Για **Περονόσπορο** (*Bremia lactucae*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 20-80 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού έως ότου η φυλλική μάζα να φτάσει το τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49). **Μία (1) εφαρμογή.**

ΑΓΓΟΥΡΙ (Y): Για **Περονόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 3^{ου} πραγματικού φύλλου έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 13-81). **Μία (1) εφαρμογή.**

ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ): Για **Περονόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. ή 100 κ.εκ./10.000m² φυλλικής επιφάνειας (LWA)*. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 3^{ου} πραγματικού φύλλου έως την συγκομιδή (BBCH 13-81). **1-2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

ΠΕΠΟΝΙ (Y): Για **Περονόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκ. Από εμφάνιση της πρώτης πλάγιας βλάστησης έως την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 21-81). **1-2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

ΠΕΠΟΝΙ (Θ), ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ + Θ): Για **Περονόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκ. Από εμφάνιση της πρώτης πλάγιας βλάστησης έως την έναρξη της συγκομιδής (BBCH 21-81). **1-2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξηρό): Για **Περονόσπορο** (*Peronospora destructor*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 20-80 λίτρα/δεκ.. Από την εμφάνιση του 5^{ου} φύλλου έως ότου οι βολβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 15-49). Μία **(1) εφαρμογή**.

ΠΑΤΑΤΑ: Για **Περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκ. μέγιστη. Όγκος ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δεκ. Από την εμφάνιση του 1^{ου} φύλλου έως το φυτό αποκτήσει το τυπικό του μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49). **1-2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

Η χρήση στο **θυμάρι** περιλαμβάνει και την δευτερεύουσα χρήση στην **ρίγανη**.

Η χρήση στον **βασίλικό** περιλαμβάνει και τις δευτερεύουσες χρήσεις στην **μέντα** και τον **δυόσμο**.

Η χρήση στην καλλιέργεια του **μαρουλιού** αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις: **Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια**.

1. Για αύξηση της αποτελεσματικότητας στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικό παράγοντα.

***Δόση LWA:** Σε γραμμικά συστήματα φύτευσης/ καλλιέργειας κάθετης ανάπτυξης, για την εφαρμογή της βέλτιστης δόσης σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, να γίνεται υπολογισμός της δόσης ανά δεκάριο λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της καλλιέργειας (ύψος βλάστησης και απόσταση μεταξύ των γραμμών) και τη δόση LWA ως εξής:

Τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο= (LWA/100.000) x Δόση LWA (από τον ανωτέρω πίνακα), όπου LWA= 2 x [ύψος βλάστησης (μέτρα) x 10.000/ απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)].

Για το αμπέλι: Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σταύρωμα μέχρι την κορυφή της βλάστησης. Η δόση LWA είναι σταθερή (120 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 20 κ.εκ. ανά δεκάριο. Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω **πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά δεκάριο:**

	Ύψος βλάστησης (μέτρα)								
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5
	2,5	5	7	10	14	19	20	20	20
	3	4	6	8	12	16	20	20	20
	3,5	3	5	7	10	14	17	20	20
	4	3	5	6	9	12	15	18	20
	4,5	3	4	5	8	11	13	16	19

Για το αγγούρι θερμοκηπίου: Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σημείο έκπτυξης της βλάστησης ή καρποφορίας μέχρι την κορυφή της βλάστησης. Η δόση LWA είναι σταθερή (100 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 20 κ.εκ. ανά δεκάριο. Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω **πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά στρέμμα για την τομάτα θερμοκηπίου:**

	Ύψος βλάστησης (μέτρα)								
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5
	2,5	4	6	8	12	16	20	20	20
	3	3	5	7	10	13	17	20	20
	3,5	3	4	6	9	11	14	17	20
	4	3	4	5	8	10	13	15	18

	4,5	2	3	4	7	9	11	13	16
--	-----	---	---	---	---	---	----	----	----

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Αγγούρι (Y), Πεπόνι (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ), Τομάτα (Y): 3 ημέρες. [Μαρούλι (Y): Κατσαρά μαρούλια (Y), Μαρούλια Σαλάτες (Y), Κεφαλωτά μαρούλια (Y), Κοινά μαρούλια (Y)], Αντίδι (Y), Λυκοτρίβολο (Y), Σχοινόπρασο (Y), [Θυμάρι (Y): Ρίγανη (Y)], [Βασιλικός (Y): Μέντα χνουδωτή (Y), δυόσμος (Y)]: 10 ημέρες. Κρεμμύδι (ξηρό), Πατάτα, Αγγούρι (Θ): 14 ημέρες. Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οινοποιήσιμο, Κουνουπίδι (Y), Μπρόκολο (Y): 20 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης- FRAC: metalaxyl-m: 4

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: •Να εφαρμόζεται το σκεύασμα προληπτικά. •Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικής ομάδας κατά FRAC). •Να χρησιμοποιείται νωρίς ή στην περίοδο ανάπτυξης νέας βλάστησης. •Να μην ξεπερνάτε τις 2-4 διαδοχικές εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν δ.α. που ανήκουν στις φαινυλαμίδες ανά καλλιέργεια και ανά έτος. Τα μεσοδιαστήματα εφαρμογών να μην ξεπερνούν τις 14 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια. Η επανείσοδος για χειρωνακτική συγκομιδή, επιτρέπεται μόνο αφού περάσουν 2 ημέρες για τον αμπέλωνα και 10 ημέρες για τις κράμβες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα RIDOMIL GOLD 465.2 SL χρησιμοποιείται **υποχρεωτικά** σε μίγμα βυτίου με τα παρακάτω εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα: ORTIVA 25 SC, REVUS 250 SC, FOLPET 80 WG (υπό συνεχή ανάδευση), LEIMAY και τους κλώνους αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο «Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί».



ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. **H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. **H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EU401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: HWPX7-YOS6-R004-G1S5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P264** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. **P501** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. •«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος» «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Φοράτε ολόσωμη αδιάβροχη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος, σε **θερμοκηπιακές καλλιέργειες υψηλής πυκνότητας**». «Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά την εφαρμογή φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι». «**Σε υπαίθριες καλλιέργειες πυκνής φύτευσης, δεν επιτρέπεται η χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός και επινώτιου ψεκαστήρα**».

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείτε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **P305+P351+P338+P337+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:**

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **P301+P312+P330 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό έως τρία (3) χρόνια στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

Λευκωσία, Τηλ. + 357 22 81 53 53

www.premier.com.cy

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

LE/RIDOMIL48SL/CY/1