



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 256 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 12/03/2025, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τις δηλώσεις επικινδυνότητας,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BOXER 80EC ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2482

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

11/07/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/01/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Boxer 80EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: prosulfocarb: 80% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 19,2% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Syngenta Chemical BV, Seneffe, Βέλγιο
2. Chemark ZRT, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία
3. Syngenta Production France S.A.S, Aigues Vives, Γαλλία
4. Briar Chemicals Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
2. Syngenta Chemical BV, Seneffe, Βέλγιο
3. Chemark ZRT, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία
4. Syngenta Production France S.A.S, Aigues Vives, Γαλλία
5. Briar Chemicals Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες / Δοχεία	1 λίτρου, 5, 10 και 20 λίτρων	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: prosulfocarb

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
1. Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
2. CAC Chemical GmbH, Γερμανία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1. KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD, Ιαπωνία
2. Lianyungang Neutech Chemical Co. Ltd, Κίνα
3. CAC Nantong Chemical Co., Ltd, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Περιέχει το δραστικό συστατικό prosulfocarb, το οποίο ανήκει στην ομάδα των θειοκαρβαμιδικών. Δρα δια της αναστολής της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων και απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με ψεκαστήρα υψηλού όγκου

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Πλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ./δεκ. μέγιστη		
Πατάτα	Πλατύφυλλα ζιζάνια*	---	20 – 40	500	Προφυτρωτικά έως την έναρξη της βλάστησης (BBCH 00-09)	1 εφαρμογή
Σιτάρι Κριθάρι Τριτικάλε	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια**	---	20 – 40	300 – 500	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων (BBCH 00-14)	1 εφαρμογή
Παρατηρήσεις: 1. Όταν χρησιμοποιείται προφυτρωτικά, να εφαρμόζεται μόνο σε καλλιέργειες σπαρμένες σε βάθος μεγαλύτερο από 2-3 εκατοστά 2. Καταπολεμούμενα ζιζάνια * ΠΑΤΑΤΑ: Προφυτρωτικά: Δόση 500 κ.εκ./δεκάριο: Ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Amaranthus blitoides</i> (Βλήτο πλανιαστό), <i>Amaranthus retroflexus</i> (Βλήτο τραχύ), <i>Anthemis mixta</i> (Ανθεμίδα), <i>Datura stramonium</i> (Τάτουλας), <i>Solanum nigrum</i> (Αγριοτοματιά) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Chenopodium album</i> (Λουβουδιά) ** ΣΙΤΑΡΙ- ΚΡΙΘΑΡΙ: Προφυτρωτικά: Δόση 300-500 κ.εκ./δεκάριο. Ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Alopecurus myosuroides</i> (Αλεπονουρά), <i>Lolium multiflorum</i> (Πολύανθη Ήρα), <i>Lolium rigidum</i> (Λεπτή Ήρα), <i>Anthemis arvensis</i>- (Ανθεμίδα), <i>Veronica hederifolia</i> (Βερόνικα), <i>Galium aparine</i> (Κολλητσίδα) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Polygonum aviculare</i> (Πολυκόμμη), <i>Matricaria</i> sp. (Χαμομήλι), <i>Veronica persica</i> (Βερόνικα) Μεταφυτρωτικά: Δόση 300-500 κ.εκ./δεκάριο. Ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Alopecurus myosuroides</i> (Αλεπονουρά), <i>Anthemis arvensis</i> (Ανθεμίδα), <i>Veronica hederifolia</i>, <i>Veronica persica</i> (Βερόνικα), Δόση 300 κ.εκ./ δεκάριο. Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Lolium rigidum</i> (Λεπτή Ήρα) Δόση 500 κ.εκ./ δεκάριο. Ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Lolium rigidum</i> (Λεπτή Ήρα) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: <i>Matricaria chamomilla</i> (Χαμομήλι)						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Πατάτα, Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε	Μη Εφαρμόσιμο λόγω του χρόνου εφαρμογής

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: N

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:

- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).
- Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε φυτά που έχουν στρεσαριστεί από άσχημες καιρικές συνθήκες, πάγο, ασθένειες ή έντομα. Επιπλέον να μην εφαρμόζεται όταν η σπορά έχει πραγματοποιηθεί σε δυσμενής συνθήκες.

Να αποφεύγετε την μεταφορά ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες και εκτάσεις κατά την εφαρμογή. Για τη μείωση του κινδύνου δημιουργίας και μεταφοράς ψεκαστικού νέφους να αποφεύγετε πιέσεις του ψεκαστικού άνω των 2 atm ή/ και χρησιμοποιήστε ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την εφαρμογή του Boxer 80 EC μπορούν να επανασπαρούν την άνοιξη: ζαχαρότευτλα, ηλιάνθος, καλαμπόκι, λινάρι, βρώμη, κριθάρι, σιτάρι, μπιζέλι, ελαιοκράμβη, φασόλι, σόγια, πατάτα, σόργο, μαρούλι, καρότο και μεταφυτευμένο λάχανο.

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS07



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Περιέχει νάφθα (διαλύτης πετρελαίου ελαφρώς αρωματικός).

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P405 Μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.

P264 Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλένετε τον προστατευτικό εξοπλισμό μετά τη χρήση.
Να φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση, κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος και κατά την εφαρμογή.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τις γειτονικές καλλιέργειες ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση διασποράς $\geq 50\%$.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης πλάτους **10 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών ή τηρείτε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης πλάτους **5 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά για την καλλιέργεια της πατάτας και ανοιξιότικων σιτηρών ή τηρείτε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

P301 +P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα αμέσως. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντληση αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα.
2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: ...11/07/2025.....



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας