



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 5006 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 21/11/2024, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
- την αίτηση με αρ. 973 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 25/04/2025, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τον Κάτοχο της άδειας, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. 2,4-D,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DICOTEX, ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2932

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/12/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Arysta LifeScience Benelux Srl

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Dicotex

2. Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

1. 2,4-D: 70g/L
2. dicamba: 20g/L
3. MCPA: 70g/L
4. mecoprop-p: 42g/L
Βοηθητικές ουσίες: 79,61% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL EUROPE Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Cerexagri (UPL group), Mourenx, Γαλλία
2. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
3. Cerexagri (UPL group), Bassens, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group), Le Canet, Γαλλία
5. Superform Chemistries Ltd., 117, 118 G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemistries Ltd., 3405/6 G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd., 3101/2 G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemistries Ltd., 3-11, G.I.D.C, Vapi, Gujarat, Ινδία
9. Superform Chemistries Ltd., Plot No. 746 & 750 G.I.D.C., Jhagadia, Gujarat Ινδία
10. Arysta LifeScience Benelux Srl., Ougree, Βέλγιο
11. Arysta LifeScience S.A.S, Noguères, Γαλλία
12. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd., Hebei, Κίνα

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Cerexagri (UPL group), Mourenx, Γαλλία
2. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
3. Cerexagri (UPL group), Bassens, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group), Le Canet, Γαλλία
5. Superform Chemistries Ltd., 117, 118 G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemistries Ltd., 3405/6 G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd., 3101/2 G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemistries Ltd., 3-11, G.I.D.C, Vapi, Gujarat, Ινδία
9. Superform Chemistries Ltd., Plot No. 746 & 750 G.I.D.C., Jhagadia, Gujarat Ινδία
10. Arysta LifeScience Benelux Srl., Ougree, Βέλγιο
11. Arysta LifeScience S.A.S, Noguères, Γαλλία
12. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd., Hebei, Κίνα
13. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Βοιωτίας, Ελλάδα
14. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα
15. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος, Ελλάδα
16. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα
17. Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
18. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
19. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd, Κύπρος

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη με βιδωτό πώμα ασφαλείας	100κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ. εκ. και 1Λ	HPDE, COEX HDPE/EVOH, PET
2.	Φιάλη με βιδωτό πώμα ασφαλείας εντός χαρτοκυτίου	100κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ. εκ.	HPDE, COEX HDPE/EVOH, PET
Το πώμα ασφαλείας να είναι τέτοιο που τα παιδιά κάτω των 5 ετών να μην μπορούν να το ανοίξουν, να αποσφραγίζεται εύκολα από ενήλικες και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την επανασφάλιση της συσκευασίας			

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. 2,4-D
2. dicamba
3. MCPA
4. mecoprop-p

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 96% (β/β) min
2. 88% (β/β) min
3. 94% (β/β) min
4. 90.5% (β/β) min

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

2,4-D:

- i. Dow AgroSciences, H.B.
- ii. CAC Chemical GmbH, Γερμανία

MCPA, Mecoprop-p:

Nufarm Limited, H.B.

Dicamba:

BASF Γερμανίας

4. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:

2,4-D:

- i. Dow AgroSciences, H.B.
- ii. Jiangxi Tianyu Chemical Co., Ltd, Κίνα

MCPA, Mecoprop-p:

Nufarm Limited, H.B.

Dicamba:

BASF Γερμανίας

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγροστωδών. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Μόλις απορροφηθεί, δεν ξεπλένεται και μεταφέρεται σε όλο το φυτό συσσωρευόμενο στους μεριστωματικούς ιστούς της νεαρής βλάστησης και των ριζών.

Το Dicotex διακόπτει την ορμονική ισορροπία και παρεμβάλλεται στη διαδικασία ανάπτυξης νεκρώνοντας τα ζιζάνια.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

☐

ερασιτέχνες χρήστες

☒

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίζουμε το ψεκαστικόδοχείο με λίγο νερό. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Συστήνεται το ξέπλυμα του ψεκαστήρα με διάλυμα 1% αμμωνιακού ή 1% ανθρακικού νατρίου και όχι μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός / Ασθένεια / Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής
		κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (κ.εκ. / m ²)	κ.εκ. σκ./m ² μέγιστη	
Χλοοτάπητες αγρωστωδών	<u>Πλατύφυλλα ζιζάνια</u> - Τριφύλλα (<i>Trifolium</i> sp.) - Αγριοράδικα (<i>Taraxacum</i> sp.) - Ρανούνκουλος (<i>Ranunculus</i> sp.) - Πολυκόμπι (<i>Polygonum</i> sp.) - Καρδαμίνη (<i>Cardamine</i> sp.) - Στελάρια (<i>Stellaria media</i>) - Περδικούλι (<i>Anagallis arvensis</i>) - Αγριοκαρώτο (<i>Daucus carota</i>) - Κεράστιο (<i>Cerastium</i> sp.) - Ζωχός (<i>Sonchus</i> sp.) - Γαϊδουράνγκαθο (<i>Carduus</i> sp.) - Κίρσιο/Ασπράνγκαθο (<i>Cirsium</i> sp.) - Πεντάνευρο (<i>Plantago</i> sp.) - Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i> , <i>Senecio jacobaea</i>) - Αγριομαργαρίτα (<i>Bellis perennis</i>) - Λάπαθο (<i>Rumex</i> sp.)	7,5 (ή 75 κ.εκ. σε 10 λίτρα)	100	0,75	- Ψεκασμός φυλλώματος - Δεν εφαρμόζεται πριν το στάδιο του αδελφώματος της χλόης. - Μία εφαρμογή, από Απρίλιο - Σεπτέμβρη

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: **ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ**

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Εφαρμόστε το σκεύασμα τουλάχιστον 5 ημέρες μετά το τελευταίο κούρεμα του χλοοτάπητα και περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες για το επόμενο.
- Μην ψεκάζετε νεαρή χλόη πριν το αδελφωμα και εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση.
- Η δραστηριότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη φωτοσύνθεση συνθήκες (θερμοκρασία και φως).
- Αποφύγετε εφαρμογές κατά την ξηρή περίοδο και όταν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών.
- Εφαρμόστε σε στεγνό γρασίδι
- Δεν συστήνεται η χρήση του αμέσως μετά από δραστική/κοντή κοπή.
- Μην χρησιμοποιείται τα υλικά από τα τρία πρώτα κουρέματα για την παρασκευή κομπόστας
- Μην ψεκάζετε λιβάδια καθώς το σκεύασμα είναι δραστικό στο τριφύλλι.
- Τα ψεκασμένα φυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.
- Να μην εφαρμόζεται σε έδαφος που ενδέχεται να οδηγήσει σε σημείο παροχής νερού (ρυάκι, δεξαμενή, λίμνη, πηγάδι), ιδιαίτερα αν το έδαφος είναι επικλινές.

Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες:

- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
- Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο σε νεροχύτες ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα γεώτρηση.
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Απαγορεύεται η πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή σε παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή.
Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασμένες περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει εντελώς.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH 208 Περιέχει 2,4-D DMA salt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς 75%.
EUH 401 *Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές συμβουλές: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εφαρμόστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν απαιτείται. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα.
P361 Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P301+P330+P315 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C .
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: ...11/07/2025....


Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας
Σφραγίδα