

Τορας 100ΕC

Τορας 100ΕC

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωϊδίου σε μπλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμνέλι, λαχανικά, καπνό, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Penconazole 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 89,36% β/β
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (ΕC)

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 1062

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΡΟΠΙΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστάμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανδούευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ): **Δίδιο** (*Podosphaera leucotricha*) με **δόση** 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-140 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από το στάδιο μεγέθους καρπού έως 10ημπ έως ότου ο καρπός να έχει 80% του τελικού του μεγέθους. BBCH 71- 78 **δόση σκευάσματος 0,25 λίτ/HA LWA. **3 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12-14 ημέρες.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ): **Δίδιο** (*Podosphaera tridactyla*, *Podosphaera pannosa*, *Sphaerotheca pannosa*) με **δόση** 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 75 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 80-150 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από τα στάδια ανάπτυξης των ωθηθικών έως το στάδιο ωρίμανσης των καρπών. BBCH 71- 89. **2 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12-14 ημέρες.

ΑΜΝΕΛΙ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ): **Δίδιο** (*Erysiphe necator*) με **δόση** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 30 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την εμφάνιση ταξινθιάς έως το κλείσιμο του τασημού. BBCH 53-79. **3 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

ΑΓΓΙΝΑΡΑ: Δίδιο (*Leveillula taurica*, *Erysiphe cichoracearum*) με **μέγιστη δόση** 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του ανθικού στελέχους έως τη συγκομιδή. BBCH 51-81. **2 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

ΦΡΑΥΛΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): **Δίδιο** (*Podosphaera aphanis*) με **δόση** 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της ανάπτυξης σταλόνων (ορατοί, περίπου 2ο) έως τη συγκομιδή. BBCH 41-89. **2 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): **Δίδιο** (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*) με **δόση** 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή. BBCH 51-89. **2 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

ΠΙΠΕΡΙΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): **Δίδιο** (*Leveillula taurica*) με **δόση** 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την εμφάνιση του 5ου άνθους έως την συγκομιδή. BBCH 55-89. **2 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): **Δίδιο** (*Leveillula taurica*, *Oidium neolyopersici*) με **δόση** 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή. BBCH 51-89. **2 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

ΚΑΠΝΟΣ: Δίδιο (*Erysiphe cichoracearum*) με **μέγιστη δόση** 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκ. Από την ανάπτυξη των πλάγιων βλαστών έως την συγκομιδή. BBCH 20-99. **2 εφάρμογές** με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ: Τριανταφυλλιά (*Sphaerotheca pannosa*, *Phragmidium* sp.), Μηνγκιόνα, Ντάλια, Καλεντούλα, Χρυσάνθεμο, Πελαργόνιο (*Erysiphe* sp., *Sphaerotheca* sp., *Oidium* sp., *Puccinia* sp., *Puccinia horiana*, *Puccinia relaragonii-zonalis*), Γαρφαλλιά, Πιτεντίλα, Αγγελική (*Puccinia* sp., *Puccinia* sp., *Oidium evonymi japon*), Japanese spindle tree (*Oidium* sp.), Λάβρα (*Puccinia* sp.) με **δόση** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του 3ου πραγματικού φύλλου/ σπείρας/ ζεύγους φύλλων έως την ωρίμανση των σπόρων/ καρπών. BBCH 13-89. **2 εφάρμογές** με 7-12 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΣΜΕΟΥΡΑ, ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ: Δίδιο (*Podosphaera aphanis*) με **δόση** 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 40 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή έως την συγκομιδή. BBCH 89. **1 εφάρμογής.**

ΜΠΑΜΙΑ: Δίδιο (*Leveillula taurica*) με **δόση** 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή. BBCH 51-79. **2 εφάρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ*: Δίδιο (*Oidium* sp.) με **δόση** 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 75 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 80-150 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο. **3 εφάρμογές.**

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ*: Δίδιο (*Oidium* sp.) με **δόση** 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή μέγιστη 50 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο. **2 εφάρμογές.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ** HA LWA: 10.000m² έκταση επιφάνειας κόμης.

- **Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φράουλα).**

- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μπάμιας και των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Αμνέλι οινόποισιμο: 21 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Βερίκοκι, Ροδάκινι, Νεκταρίνι, Αγκινάρα, Αμνέλι επιτραπέζιο, Καπνός: 14 ημέρες. Μπάμια: 7 ημέρες. Φράουλα, Αγγούρι, Κολοκύνθη, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σμέουρα, Βατόμουρα: 3 ημέρες. **Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά δέντρα, Καλλωπιστικοί θάμνοι:** Μπ εφαρμοσμο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διακρίσιμη ανθεκτικότητα: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

- Στο αγνέλι και στα μπλοειδή η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο, στις υπόλοιπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φράουλα, αγκινάρα, πιπεριά, μπάμια, τομάτα, μελιτζάνα και ανθοκομικά και καλλωπιστικά θάμνοι) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα DMIs των 50% των συνολικών επεμβάσεων.
- Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγές μυκητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μείγματα μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τις χρήσεις στα ανθοκομικά φυτά σε περίπτωση ποικιλιών ελάχιστα διαδεδομένων ή πρόσφατα εισαγμένων στη χώρα, να κάνετε δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405-P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. **P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φοράτε βαμβάκερο μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια. **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τα συσκευασία του.

Spe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήσετε απέκαστη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

ΕΥΗ 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: P10R-03TX-1000-93HU

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ή την ετικέτα.

P305-P351-P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **P337-P313** Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P308-P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυόμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποίησός του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Premier Shukrugolou Cyprus Ltd.,
Τηλ: 22815353 – Λευκωσία
www.premier.com.cy
contact@premier.com.cy

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

LE/TOPAS10EC/CY/9