



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 744 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 12/06/2023, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος AFFIRM ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2906

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

12/09/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθοριστεί μετά την επανέγκριση του προϊόντος, βάσει του άρθρου 43

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Affirm

2. Μορφή:

Υδατοδιαλυόμενοι κόκκοι (SG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

emamectin benzoate: 0,95% β/β
βοηθητικές ουσίες: 99% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG Ελβετίας

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Gowan Milling, LLC – ΗΠΑ
2. STI Solfotecnica Italiana SpA, Ιταλία
3. CHEMARK ZRT, Hungary
4. Exwold Technology Limited, UK
5. Kwizda Agro GmbH, Αυστρία
6. Syngenta España S.A., Ισπανία
7. Syngenta Production France S.A.S., St. Pierre, Γαλλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
2. Gowan Milling, LLC – ΗΠΑ
3. STI Solfotecnica Italiana SpA, Ιταλία
4. CHEMARK ZRT, Hungary
5. Exwold Technology Limited, UK
6. Syngenta Production France SAS, St. Pierre, Γαλλία
7. Kwizda Agro GmbH, Αυστρία
8. Syngenta España S.A., Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί	50 γρ. - 10 κιλών	Σακούλα από Fluorinated HDPE (high density polyethylene), εντός χαρτοκυτίου ή Σακούλα από τριστρωματικό φιλμ εντός χαρτοκυτίου (paper/polyethylene laminate with additional barrier material (polyethylene terephthalate/met))
2	Δοχείο	50 γρ. - 10 κιλών	Fluorinated HDPE (high density polyethylene)
3	Δοχείο ή κουτί	250 γρ. - 5 κιλών	Εξωτερικά χαρτόκουτο με ειδικά ενισχυμένη εσωτερική σακούλα PET/PE
4	Δοχείο	10 κιλών	Εξωτερικά χαρτόκουτο με ειδικά ενισχυμένη εσωτερική σακούλα PET/PE
5	Μπουκάλι	50 γρ. - 3 κιλών	HDPE (high density polyethylene)
6	Μπιτόνι	5 κιλών - 10 κιλών	HDPE (high density polyethylene)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: emamectin benzoate
2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95% w/w min.
3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Syngenta Crop Protection AG Ελβετίας
4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1. Syngenta Nantong Crop Protection Co., Ltd., Κίνα
2. Qilu SYNVA Pharmaceutical Co., Ltd, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων της αμπέλου, των καρποφόρων και των σπωροκηπευτικών. Το Affirm ανήκει στην οικογένεια των αβερμεκτινών. Δρα παρεμποδίζοντας τη μεταβίβαση των νευρικών σημάτων του εντόμου μέσω του καναλιού του χλωρίου. Το έντομο παύει να τρέφεται και υφίσταται μία μη ανατρέψιμη παράλυση. Το Affirm δρα ειδικώς στις προνύμφες των λεπιδοπτέρων εξ επαφής και διά στομάχου.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος – Μην εφαρμόζετε κατά τις ζεστές ώρες της ημέρας, σε βρεγμένα φύλλα ή σε περίπτωση βροχής

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με νερό κατά το 1/4. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Αναδεύετε και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ. σκ./δεκ.		
Αμπέλι Επιτραπέζιο & οиноποιήσιμο	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) Κοχυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	150	150	Πριν την άνθηση με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών για την πρώτη γενιά Για τη δεύτερη και τρίτη γενιά εφαρμόστε στο στάδιο του «μαύρου κεφαλιού». Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής πραγματοποιείστε την 1ην εφαρμογή κατά το στάδιο εναπόθεσης των αυγών και τη 2ην μετά από 7-14 ημέρες	3
	Καρπόκαψα <i>Cydia Pomonella</i> <i>Cydia molesta</i>			Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	2 Με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών
Μηλοειδή Μηλιά Αχλαδιά	Φυλλοδέτεες: (<i>Adoxophyes</i> spp., <i>Pandemis</i> spp., <i>Archips</i> spp., <i>Argyrotaenia</i> spp.)	300	300-400	Για τις διαχειμάζουσες προνύμφες: πριν ή μετά την άνθηση Θερινές γενεές: Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	
	Φυλλορύκτες: (<i>Leucoptera</i> spp., <i>Phyllonorycter</i> spp)			Με την εμφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα	
Πυρηνόκαρπα Ροδάκινια Νεκταρινιά Βερικοκιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>)			Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	3 Με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών
	Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>)	300	300-400	Για τις διαχειμάζουσες προνύμφες: πριν ή μετά την άνθηση Θερινές γενεές: Με την εκκόλαψη των πρώτων αυγών ή στο αποκορύφωμα των πτήσεων χρησιμοποιώντας παγίδες παρακολούθησης	
	Φυλλορύκτες <i>Phyllonorycter</i> spp.			Με την εμφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα	

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ. σκ./δεκ.		
Υπαίθρου Αγκινάρα Φασόλια (με και χωρίς λοβό) Μπρόκολα Κουνουπίδι Κραμπί Υπαίθρου & Θερμοκηπίου Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα Φράουλα	Λεπιδόπτερα <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Plusia gamma</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Plutella xylostella</i> , <i>Depressaria erinaceella</i> , <i>Tuta absoluta</i>	150	150	ψεκασμός κάλυψης με την εμφάνιση της προσβολής	3 Με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών
		150	150		
Υπαίθρου & Θερμοκηπίου Λυκοτριβόλο Κάρδαμο Γαιοκάρδαμο Ρόκα Άγρια Ρόκα Σινάπι Φύλλα & Βλαστοί των ειδών <i>Brassica spp</i> Υπαίθρου Μαρούλια	<i>Spodoptera spp.</i> <i>Ostrinia nubilalis</i>	150	150		

Παρατηρήσεις:

1. Ανεξάρτητα του όγκου του ψεκαστικού υγρού που θα χρησιμοποιηθεί, να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση σκευάσματος ανά δεκάριο.
2. Μην αναμινύεται το προϊόν με λάδι όταν εφαρμόζετε στη βερικοκιά

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Βερικοκιά	14 ημέρες
Αμπέλι, μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, νεκταρινιά	7 ημέρες
Υπόλοιπες καλλιέργειες	3 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Ομάδα Τρόπου Δράσης: 6

- Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.
- Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Στις λιγότερο διαδεδομένες ή νέες ποικιλίες λαχανικών να πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή. Να μην χρησιμοποιείται σε αμπέλια στα φυτώρια.

10. Συνδυαστικότητα:


Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλα σκευάσματα, να πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όργανα (νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P260** Μην αναπνέετε σκόνη.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για τις καλλιέργειες κηπευτικών χαμηλού ύψους (< 50 εκ.), 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και των υπόλοιπων κηπευτικών (> 50 εκ.) και 30 μέτρων από τις καλλιέργειες των οπωρώνων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Spe3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της μηλιάς.
- Spe8** **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
«Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- P314:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για μερικά λεπτά διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα, και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και διατηρήστε τον ζεστό σε ανάπαυση. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων
- Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Μην προκαλέσετε εμετό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντληση των αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα.
2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 12/09/2025.....



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας