



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3162 (Έντυπο 05), ημερομηνίας 12/01/2018, για ανανέωση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και

την επιστολή του αιτητή για ανανέωση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για ανανέωση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία,

ανανεώνεται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CONTROL MEGA ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3103

Ημερομηνία ανανέωσης άδειας:

13/11/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, βάσει Άρθρου 43

2. Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Control Mega

2. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

glyphosate οξύ 48% β/ο (υπό μορφή άλατος
διμεθυλαμίνης: 60,8% β/ο)
βοηθητικές ουσίες: 47,50% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία
2. Agrokemia Sellye Zrt., Ουγγαρία
3. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.
Ltd, Κίνα
4. Albaugh LLC, ΗΠΑ
5. Chemark Zrt., Ουγγαρία
6. Industrias Afrasa S.A., Ισπανία.
7. BAC d.o.o., Σλοβενία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία
2. Agrokemia Sellye Zrt., Ουγγαρία
3. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.
Ltd, Κίνα
4. Albaugh LLC, ΗΠΑ
5. Chemark Zrt., Ουγγαρία
6. Industrias Afrasa S.A., Ισπανία.
7. BAC d.o.o., Σλοβενία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ.εκ., 1Λ, 2Λ, 2.5Λ, 3Λ, 5Λ	PET ή HDPE
2	Δοχεία	10Λ, 20Λ, 25Λ και 50Λ	PET ή HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: glyphosate

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Albaugh LLC, ΗΠΑ
2. Bayer Agriculture BV, Βέλγιο
3. Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical Technology Co., Ltd (FUHUA), Κίνα
4. Hubei Trisun Chemicals Co., Ltd, Κίνα
5. Guang'an Chengxin Chemical Co., Ltd (CHENGXIN), Κίνα
6. Zhenjiang Jiangnan Chemicals Co. Ltd (WYNCA), Κίνα

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Albaugh LLC, ΗΠΑ
2. Bayer Agriculture BV, Βέλγιο
3. Monsanto do Brasil Ltda, Βραζιλία
4. Monsanto Zarate Plant, Αργεντινή
5. Bayer CropScience LP Luling Plant, ΗΠΑ
6. Bayer CropScience LP Muscatine Plant, ΗΠΑ
7. Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical Technology Co., Ltd (FUHUA), Κίνα
8. Hubei Trisun Chemicals Co., Ltd., Κίνα
9. Guang'an Chengxin Chemical Co., Ltd., (CHENGXIN), Κίνα
10. Zhenjiang Jiangnan Chemicals Co. Ltd (WYNCA), Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά δεκάριο και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.

Για την οροβάγχη στο καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά δεκάριο με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας.

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Να μην χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Τρόπος καθαρισμού ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε το ψεκαστήρα και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος *		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ./δεκ.		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: - Πορτοκαλιά CIDS1 - Μανταρινιά CIDRE - Λεμονιά CIDLI - Γκρέιπφρουτ CIDPA	Ετήσια ζιζάνια ¹ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)		115 – 150	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	2
	Μολόχα (<i>Malva</i> sp. – MALSS) Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp. – URTSS)				
	Πολυκόμμι (<i>Polygonum</i> sp. - POLSS) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> - POROL)	20 – 40	300 – 450		
ΑΚΡΟΔΡΥΑ: - Αμυγδαλιά PRNDU	Πολυετή ζιζάνια ²		565 – 667	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή	1
	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> - CYNDA)				
	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA) Φτέρη (<i>Pteridium aquilinum</i> - PTEAQ)		375		
		20 – 40	375		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: - Βερυκοκιά PRNAR - Ροδακινιά PRNPS - Κερασιά PRNAV - Δαμασκηνιά PRNDO Ελιές OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιολαίσιμες)	Κύπερη (<i>Cyperus</i> sp. - CYPSS)		400 (1 ^η εφαρμογή) 375 (2 ^η εφαρμογή) εφαρμογή)	α) 1 ^η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2 ^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης	2

Καπνός NIOTA	Οροβάγχη (<i>Orobancha</i> <i>Ramosa</i> ORARA)	30-40	α) 30 β) 45	ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 μέρες μετά τη μεταφύτευση β) 60 μέρες μετά τη μεταφύτευση	2
	Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	20 – 40	115 – 150	Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης.	1
Βαμβάκι ³ GOSHI	Πολυετή ζιζάνια	20 – 40	375		
	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA)	20 – 40	115-150	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης	2
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Ετήσια ζιζάνια ¹ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	20-40	300-450		
	Μολόχα (<i>Malva</i> sp. – MALSS) Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp. - URTSS) Πολυκόμμι (<i>Polygonum</i> sp. - POLSS) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> - POROL)	20-40	300-450		

Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν τη κατεργασία του εδάφους για σπορά	Πολυετή ζιζάνια ²	20-40		Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή	1
	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA)		375		
	Φτέρη (<i>Pteridium aquilinum</i> - PTEAQ)		375		
	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> CYNDA)		565-600		
	Κύπερη (<i>Cyperus</i> sp. - CYPSS)		400 (1 ^η εφαρμογή) 375 (2 ^η εφαρμογή)		
	Ξυλώδεις θάμνοι, δένδρα, βάτα κλπ	20-40	375-600	α) 1 ^η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2 ^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης	2
	Ετήσια ζιζάνια ¹ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	20 – 40	115 – 150	Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη	1
	Μολόχα (<i>Malva</i> sp. – MALSS) Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp. - URTSS) Πολυκόμμι (<i>Polygonum</i> sp. - POLSS) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> -		300 – 450		

POROL)					
Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών	Πολυετή ζιζάνια ²				
	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA)		375		
	Φτέρη (<i>Pteridium aquilinum</i> - PTEAQ)		375		
	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> CYNDA)		565-600		
	Κύπερη (<i>Cyperus</i> sp. - CYPSS)		400 (1 ^η εφαρμογή) 375 (2 ^η εφαρμογή)		
	Υδροχαρή ζιζάνια	20-40	600		
* Μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών για 12 μήνες = 432 γρ. glyphosate / δεκάριο, που ισοδυναμεί με 900 κ.εκ. σκευάσματος / δεκάριο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μια με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη ή/και καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης. 2. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. 3. Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα ακροφύσια. 4. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των ψεκαστικών σταγονιδίων με φύλλωμα τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπυρώνες από το τρίτο (3^ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 5. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια <i>Malva</i> spp. (μολόχα), <i>Urtica</i> spp. (τσουκνίδα), <i>Polygonum</i> spp. (πολυκόμμι, λαπάτσα), <i>Portulaca oleraceae</i> (αντράκλα) η δόση κυμαίνεται από 300-450 κ.εκ. /δεκάριο ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους.					

6. Για την αγριάδα η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ.
7. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.
8. Η χρήση στη Λεμονιά (CIDL) περιλαμβάνει τη χρήση στην Κιτριά (CIDME).
9. Η χρήση στη Μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνει τη χρήση στις Κλημεντίνες (CIDRE).
10. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Ελιά (επιτραπέζιες ποικιλίες) Ελιά (ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) Βαμβάκι, Καπνός	7 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρούτ, Κιτριά, Αμυγδαλιά	Μη εφαρμόσιμο
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών (απουσία νερού).	Μη εφαρμόσιμο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή των καρπών με το σκεύασμα ή με το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί.
2. Για τις ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
3. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
4. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
7. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - HRAC: Glyphosate: 9

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -
α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών, για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.
Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει *disodium cocoatrphodipropionate*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ασέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 5 μέτρων ή
- 1 μέτρου σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 13/12/2025.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 13/05/2026.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 13/05/2026, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021

Ημερομηνία: 13/11/2025



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας