



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3287 (Έντυπο 05), ημερομηνίας 31/05/2018, για ανανέωση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και

την επιστολή του αιτητή για ανανέωση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για ανανέωση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

ανανεώνεται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CONTROL SL ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3505

Ημερομηνία ανανέωσης άδειας:

13/11/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, βάσει Άρθρου 43

2. Κάτοχος της άδειας:

ALBAUGH TKI d.o.o., Σλοβενία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Control SL

2. Μορφή:

Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

glyphosate οξύ 36% β/ο (υπό μορφή άλατος
ισοπροπυλαμίνης: 48,3% β/ο)
βοηθητικές ουσίες: 56,55% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενία
2. Chemark Zrt., Ουγγαρία
3. Agrokemia Sellye Zrt., Ουγγαρία
4. Industrias Afrasa S.A., Ισπανία
5. BAC d.o.o., Σλοβενία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενία
2. Chemark Zrt., Ουγγαρία
3. Agrokemia Sellye Zrt., Ουγγαρία
4. Industrias Afrasa S.A., Ισπανία
5. BAC d.o.o., Σλοβενία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100 κ.εκ. έως 1 Λίτρο	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	100 – 500 κ.εκ.	HDPE Χάρτινο κουτί
3	Δοχεία	5 έως 25 Λίτρα	HDPE
4	Βαρέλια	50 έως 200 Λ	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: glyphosate

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Albaugh LLC, ΗΠΑ
2. Bayer Agriculture BV, Βέλγιο
3. Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical Technology Co., Ltd., Κίνα
4. Hubei Trisun Chemicals Co., Ltd., Κίνα
5. Guang'an Chengxin Chemical Co., Ltd., Κίνα
6. Wynca Zhenjiang Jiangnan Chemicals Co. Ltd, Κίνα

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Albaugh LLC, ΗΠΑ
2. Bayer Agriculture BV, Βέλγιο
3. Monsanto do Brasil Ltda., Βραζιλία
4. Monsanto Zarate Plant, Αργεντινή
5. Bayer CropScience LP, Luling Plant, ΗΠΑ
6. Bayer CropScience LP, Muscatine Plant, ΗΠΑ
7. Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical Technology Co., Ltd., Κίνα
8. Hubei Trisun Chemicals Co., Ltd., Κίνα
9. Guang'an Chengxin Chemical Co., Ltd., Κίνα
10. Wynca Zhenjiang Jiangnan Chemicals Co. Ltd, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μην χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για την διάλυση του φαρμάκου.

Τρόπος καθαρισμού ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε το ψεκαστήρα και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος *		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ./δεκ.		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: - Πορτοκαλιά CIDS1 - Μανταρινιά CIDRE - Λεμονιά CIDLI - Γκρέιπφρουτ CIDPA ΑΚΡΟΔΡΥΑ: - Αμυγδαλιά PRNDU	Ετήσια ζιζάνια ¹ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)		150 – 200	Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης.	2
	Μολόχα (<i>Malva</i> sp. – MALSS) Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp. – URTSS) Πολυκόμμι (<i>Polygonum</i> sp. – POLSS) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> – POROL)	20 – 40	400 – 600		
	Πολυετή ζιζάνια² Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> – CYNDA) Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> – SORHA) Φτέρη (<i>Pteridium aquilinum</i> – PTEAQ)		750 – 890	Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή	1
		20 – 40	500		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: - Βερικοκιά PRNAR - Ροδακινιά PRNPS - Κερασιά PRNAV Ελιές OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιολαίσιμες)	Κύπερη (<i>Cyperus</i> sp. – CYPSS)		600 (1 ^η εφαρμογή) 500 (2 ^η εφαρμογή)	α) 1 ^η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2 ^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης	2

Καπνός NIOTA	Οροβάγχη (<i>Orobancha ramosa</i> - ORARA)	30-40	α) 40 β) 60	Ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 μέρες μετά τη μεταφύτευση β) 60 μέρες μετά τη μεταφύτευση	2
Βαμβάκι ⁶ GOSHI	Ετήσια ζιζάνια ¹ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	20 – 40	150 – 200	Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης.	1
	Πολυετή ζιζάνια ²		500		
	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA)				
Ακαλιέρηγες εκτάσεις (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές)	Ετήσια ζιζάνια ¹ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)	20-40	150-200	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης	2
	Μολόχα (<i>Malva</i> sp. – MALSS) Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp. - URTSS) Πολυκόμμι (<i>Polygonum</i> sp. - POLSS) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> - POROL)		400-600		
	Πολυετή ζιζάνια ²				
		20-40		Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή	1

	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA)		500			
	Φτέρη (<i>Pteridium aquilinum</i> - PTEAQ)		500			
	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> CYNDA)		750-800			
	Κύπερη (<i>Cyperus</i> sp. - CYPSS)		600 (1 ^η εφαρμογή) 500 (2 ^η εφαρμογή)		α) 1 ^η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2 ^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης	2
	Ξυλώδεις θάμνοι, δένδρα, βάτα κλπ		500-800	20-40	Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη	1
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν τη κατεργασία του εδάφους για σπορά	Ετήσια ζιζάνια¹ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)		150 – 200			
	Μολόχα (<i>Malva</i> sp. – MALSS) Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> sp. - URTSS) Πολυκόμπι (<i>Polygonum</i> sp. - POLSS) Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> - POROL)		400 – 600	20 – 40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης	1
	Πολυετή ζιζάνια²			20 – 40	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται	1

Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA)	500	κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή	2
	Φτέρη (<i>Pteridium aquilinum</i> - PTEAQ)			
	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> CYNDA)			
	Κύπερη (<i>Cyperus</i> sp. - CYPSS)	600 (1 ^η εφαρμογή) 500 (2 ^η εφαρμογή)	α) 1 ^η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2 ^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης	
	Υδροχαρή ζιζάνια	20-40	800	Εφαρμογή μόνο σε στεγνά κανάλια, κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων

* Μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών για 12 μήνες = 432 γρ. glyphosate / δεκάριο, που ισοδυναμεί με 1200 κ.εκ. σκευάσματος / δεκάριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για την καταπολέμηση ετησίων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα – άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι - φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης.

2. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

3. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιπρέπειται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3^ο έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.

4. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* sp. (μολόχα), *Urtica* sp. (τσουκνίδα), *Polygonum* sp. (πολυκόμμι, λαπάτσα), *Portulaca oleraceae* (αντράκλα) η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ. / δεκάριο ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους.

5. Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ.

6. Για την αγριάδα η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά.

7. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

8. Να μη γίνεται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.

9. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

10. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
11. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν, πριν τη συγκομιδή τους.
12. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
13. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
14. Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνει τη χρήση στην Κιτριά (CIDME).
15. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Επιτραπέζιες ελιές, Ελαιοποιήσιμες ελιές, Βαμβάκι, Καπνός	7 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Βερικοκιά, Κερασιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρούτ, Κιτριά, Αμυγδαλιά	Μη εφαρμόσιμο
Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών (απουσία νερού):	--

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
- Στις δενδρώδεις καλλιέργειες ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το τρίτο (3^ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
- Να αφήνετε μια περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών πριν αφήσετε το νερό να τρέξει ξανά στα αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια.
- Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα που έχουν ψεκαστεί για ζωοτροφή.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - HRAC: Glyphosate: 9

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών, για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα.
Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

S_{Pe}3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75 % από μη γεωργική γη.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:


Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 13/12/2025.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 13/05/2026.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 13/05/2026, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021

Ημερομηνία: 13/11/2025




Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας