



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφα ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά δεκάριο και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκατικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβόλχη στο καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά δεκάριο με ψεκασμό καλύψεως της φυτικής. Χρησιμοποιείτε μικρ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατόσφαιρες (30 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το ψεκατήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναθεύοντας τη συστατώμενη δόση του ακευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Να μην χρησιμοποιείτε ακαθάρτα ή ακληρά νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκατήρα. Ξεπλύνετε το ψεκατήρα και όλα τα εξαρτήματα του ψεκατικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΥΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιολιπώμενες ποικιλίες), Βαμβάκι, Καπνός: 7 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημενίνη, Λεμονιά, Γκρέϊν-φρούτ, Κιτριά, Αμυγδαλιά, Αγρού μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλλυγρητες εκτάσεις, Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών (απουσία νερού): Μπ εφαρμοσίμο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

1. Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή των καρπών με το ακευάσμα ή με το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί.
2. Για τις ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
3. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεαμένες στο έδαφος ελιές.
4. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
7. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για αποροπαργαγωγή.
8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - HRAC: Glyphosate: 9

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ -

i) ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επί (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπτάσφρων (14) ημερών, για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

ii) ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκατικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΩΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαρβασίση στασκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΥΥΡΞΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλματος τα ρίχνουμε στο ψεκατικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίπηγια για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθίβεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποίηση του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Control Mega

Εγγυημένη σύνθεση:
Glyphosate οξύ 48% B/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης: 60,8% B/ο)
Βοηθητικές ουσίες 47,50% B/B

Πυκνό διάλυμα (SL)
Glyphosate

Αρ. Άδειας: 3103

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβόλχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν την από την χρήση.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1Lt e



Premier Shukuroglou

www.premier.com.cy

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει **disodium cocoaphosphorionate**. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401 Για να αποφευχθεί κινδύνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P262 Να μην έρχε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P405+P102 Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

«Φοράτε αλόωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του ακευάσματος». «Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρο παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών».

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αμέσαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 5 μέτρων ή

- 1 μέτρον σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκατικού νέφους κατά 75%.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΪΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Αριθ. Παρτίδας (Batch No) & Ημερ. Παραγωγής (Man. Date):
βλέπε συσκευασία

Κάτοχος της Άδειας:

Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21,
SI-2327 Rače, Σλοβενία

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

Ιερώνην Σουκίουρογλου 4,
Βιομηχανική Ζώνη Λατσιών,
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22 81 53 53

E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy



5 12 9 0 7 7 0 1 0 4 8 1 9

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ



L/CONTMEGA/11/17/17

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών		
		Δόσεις σκευάσματος*					
		Όγκος ψεκ.υγρού (λίτρα/δεκ.)	κ.εκ. / δεκ.				
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: - Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιφρουτ ΑΚΡΟΔΡΥΑ: - Αμυγδαλιά ΜΗΛΟΕΙΔΗ: - Μηλιά - Αχλαδιά ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: - Βερυκοκιά - Ροδακινιά - Κερσιδιά - Δαμασκηνιά Ελιές (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες)	Ετήσια ζιζάνια¹ (αγρωσώδη και πλατύφυλλα)	20 - 40	115 - 150	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.	2		
	Μολόχα (Malva sp.), Τσουκνίδα (Urtica sp.), Πολυκόμμη (Polygonum sp.), Αντράκλα (Portulaca oleracea)		300 - 450				
	Πολυετή ζιζάνια²	20 - 40	400 (1 ^η εφαρμογή) 375 (2 ^η εφαρμογή)	565 - 667	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτά.	1	
	Αγριόδα (Cynodon dactylon)			375			
	Βέλιουρας (Sorghum halepense)			375			
	Φτέρνη (Pteridium aquilinum)			375			
	Κύπερη (Cyperus sp.)				α) 1 ^η εφαρμογή κατά την άνθηση β) 2 ^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβάστασης	2	
Βαμβάκι³	Ετήσια ζιζάνια (αγρωσώδη και πλατύφυλλα)	20 - 40	115 - 150	Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης.	1		
	Πολυετή ζιζάνια						
	Βέλιουρας (Sorghum halepense)		375				
Καπνός	Οροβάγχη (Orobanche ramosa)	30 - 40	α) 30, β) 45	Ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 ημέρες μετά την μεταφύτευση, β) 60 ημέρες μετά την μεταφύτευση	2		
Ακαλλιέργητες εκτάσεις Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν τη κατεργασία του εδάφους για σπορά	Ετήσια ζιζάνια¹ (αγρωσώδη και πλατύφυλλα)	20 - 40	115 - 150	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης	2		
	Μολόχα (Malva sp.) Τσουκνίδα (Urtica sp.) Πολυκόμμη (Polygonum sp.) Αντράκλα (Portulaca oleracea)		300 - 450				
	Πολυετή ζιζάνια²		400 (1 ^η εφαρμογή) 375 (2 ^η εφαρμογή)			Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή	1
	Βέλιουρας (Sorghum halepense)						
	Φτέρνη (Pteridium aquilinum)	565-600					
	Αγριόδα (Cynodon dactylon)			α) 1η εφαρμογή κατά την άνθηση, β) 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβάστασης	2		
	Κύπερη (Cyperus sp.)						
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Ευλώδεις θάμνοι, δένδρα, βάτα κλπ		375-600	Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη			
Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών	Υδροκαρή ζιζάνια		600	Εφαρμογή μόνο σε στενά κανάλια, κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων	1		

* Μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών για 12 μήνες = 432 γρ. glyphosate / δεκάρια, που ισοδυναμεί με 900 κ.εκ. σκευάσματος / δεκάρια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μια με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη ή/και καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. - 2. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. - 3. Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα ακροφύσια. - 4. Στις δένδρωδεις καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των ψεκαστικών σταγονιδίων με φύλλωμα τριφυερούς βλαστάσις, παραφύσους και μη επιουλωμένες πηλγές κλαδέματας. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους ωριωμένες από το τρίτο (3ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. - 5. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva spp.* (μολόχα), *Urtica spp.* (τσουκνίδα), *Polygonum spp.* (πολυκόμμη, λαπάστα), *Portulaca oleracea* (αντράκλα) η δόση κυμαίνεται από 300-450 κ.εκ. /δεκάρια ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. - 6. Για την αγριόδα η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ. - 7. Για τη φτέρνη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλώμα της κορυφής. - 8. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει τη χρήση στην Κιτριά. - 9. Η χρήση στη Μανταρινιά περιλαμβάνει τη χρήση στις Κλημεντίνες. - 10. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει τη χρήση στη Νεκταρινιά.