



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 288 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 11/11/2025, για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με το φάσμα δράσης (τρόπος και χρόνος εφαρμογής του σκευάσματος),
- την αίτηση με αρ. 1059 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 28/11/2025, για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CAPTAN 80WG ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3072

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

19/12/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

Θα καθοριστεί μετά την επανέγκριση του προϊόντος, βάσει του άρθρου 43

2. Κάτοχος της άδειας:

Arysta LifeScience S.A.S.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Captan 80 WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Captan: 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 14,4% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Cerexagri (UPL group) Bassens, Γαλλία
3. Cerexagri (UPL group) Le Canet, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group) Mourenx, Γαλλία
5. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 117/118, GIDC., Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3405/3406, GIDC., Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd. (UPL group) 3101/1,2,3, G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3-11, GIDC, Vapi, Gujarat, Ινδία
9. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) Plot No 746/750 P.B No. 9, GIDC, Gujarat, Ινδία
10. Arysta LifeScience Ougrée Production Srl (UPL group) Ougrée, Βέλγιο
11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group) Noguères, Γαλλία
12. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd, Hebei, Κίνα
13. UPL Limited, 3210 3201/A, G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
14. M/S ARYSTA LIFESCIENCE INDIA LIMITED (UPL Group), 50 A, G.I.D.C., Kalol, Gujarat, Ινδία
15. Superform Chemistries Limited (UPL Group), Survey No. 225, Taluka Halol, Gujarat, Ινδία
16. Kwizda Agro GMBH, Leobendorf, Αυστρία
17. SBM Formulation, Beziers Cedex, Γαλλία
18. EXWOLD TECHNOLOGY, Hartlepool, Ηνωμένο Βασίλειο
19. Taminco Crop Protection, Gent, Βέλγιο
20. ADICA, Bologna, Ιταλία
21. YINGDE GREATCHEM CHEMICALS CO., LTD, Guangdong Province, Κίνα

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Cerexagri (UPL group) Bassens, Γαλλία
3. Cerexagri (UPL group) Le Canet, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group) Mourenx, Γαλλία
5. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 117/118, GIDC., Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3405/3406, GIDC., Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd. (UPL group) 3101/1,2,3, G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3-11, GIDC, Vapi, Gujarat, Ινδία
9. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) Plot No 746/750 P.B No. 9, GIDC, Gujarat, Ινδία
10. Arysta LifeScience Ougrée Production Srl (UPL group) Ougrée, Βέλγιο
11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group) Noguères, Γαλλία
12. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd, Hebei, Κίνα
13. UPL Limited, 3210 3201/A, G.I.D.C., Ankleshwar, Ινδία

14. M/S ARYSTA LIFESCIENCE INDIA LIMITED (UPL Group), 50 A, G.I.D.C., Kalol, Gujarat, Ινδία
15. Superform Chemistries Limited (UPL Group), Survey No. 225, Taluka Halol, Gujarat, Ινδία
16. Kwizda Agro GMBH, Leobendorf, Αυστρία
17. SBM Formulation, Beziers Cedex, Γαλλία
18. EXWOLD TECHNOLOGY, Hartlepool, Ηνωμένο Βασίλειο
19. Taminco Crop Protection, Gent, Βέλγιο
20. ADICA, Bologna, Ιταλία
21. YINGDE GREATCHEM CHEMICALS CO., LTD, Guangdong Province, Κίνα
22. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, 80ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο, Θήβα
23. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
24. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
25. Agrotechnica Ο.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης 57022 Σίνδος
26. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ, Θέση Ποταμιά, 32 011 Οινόφυτα, Βοιωτία
27. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd., Κύπρος

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100γρ. ως 10 κιλά	Σακούλα πολυαιθυλενίου, Κουτί χάρτινο
2	Σακούλα	100γρ. ως 10 κιλά	Πολυαιθυλένιο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Captan

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: >910 gr/Kg

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Arysta LifeScience Corporation, Ιαπωνία
2. UPL Limited, Ινδία

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

1. Makhteshim Chemical Works Ltd, Israel
2. India Pesticides Limited (IPL), Ινδία
3. Yingde Greatchem Chemicals Co Ltd, Κίνα
4. UPL Limited, Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε τον ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε τη στο ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώνεται το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ./δεκ. μέγιστη		
Μηλοειδή: - Μηλιά [MABSD] - Αχλαδιά [PYUCO] - Κυδωνιά [CYDOB] - Αχλαδομηλιά [PYUPY]	Φουζικλάδιο (<i>Venturia</i> sp.) [VENTSP]	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως την εμφάνιση των μπουμπουκιών BBCH (09-59)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7- 14 ημέρες
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών BBCH (71-89)	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7- 14 ημέρες
					Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή (BBCH 91-97)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7- 14 ημέρες
						Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH>7,5
Ροδακινιά* [PRNPS]	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 10-59) και από το τέλος της ανθοφορίας μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους. (BBCH 71-75)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7- 14 ημέρες
	<u>Χρήση</u> <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας</u> Φουζικόκοκο ή φόμοψη (<i>Fusicoccum amygdali</i> ** [FUSCAM] ή	300	100	300	Κατά την πτώση των φύλλων (BBCH 93-97)	1

	<i>Phomopsis amygdali</i> ** [FUSCAM]					
Δαμασκηλιά [PRNDO]	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του λήθαργου έως την αρχή της βλάστησης (BBCH 01-11)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7- 14 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου) [LYPES]	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp) [1ALTEG]	---	60 – 120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων [εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)]	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7- 14 ημέρες
Χρήση Ήσσονος Σημασίας Αμυγδαλιά** [PRNDU]	Φουζίκωκκο ή φόμοψη (<i>Phomopsis amygdali</i>) [FUSCAM] Κλαδοσπορίωση (<i>Venturia carpophila</i> ή <i>Cladosporium carpophilum</i>) [VENTCA] Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) [TAPHDE] Κορύνεο (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>) [STIGCA] Πολυστιγμάτωση (<i>Polystigma ochraceum</i>) [POLTOC] Φαϊά σήψη (ανθέων και κλάδων) (<i>Monilia</i> sp.)	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ανθέων (BBCH 93-59)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 14 ημέρες

	[1MONIG]						
Χρήση <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας</u> Κελιφωτό φιστίκι** [PIAVE]	Σεπτόρια (<i>Septoria pistaciae</i>) [SEPTPZ] Βοτρυοσφαίρια (<i>Botryosphaeria</i> sp.) [BOTSSP] Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> sp.) [ALTESP]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 14 ημέρες	
Χρήση <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας</u> Καρυδιά** [JUGRE]	Ανθράκωση (<i>Marssonina juglandis</i>) [GNOMLE]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 14 ημέρες	
Χρήση <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας</u> Καστανιά** [CSNSA]	Ανθράκωση (<i>Mycosphaerella Maculiformis</i>) [MYCOMC]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 93-59)	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 14 ημέρες	
Παρατηρήσεις: 1. Εφαρμόζεται προληπτικά. 2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να εξακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 3. Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας και όταν υπάρχουν ανθοφόρα ζιζάνια στις σειρές των καλλιεργειών που θα υποστούν αγωγή. 4. Οι εφαρμογές σε σπωρώνες να γίνονται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής ο οποίος αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής (π.χ. προστατευτικές ασπίδες εκπομπών, ψεκαστήρες με καλύπτρα, γραμμικοί ψεκαστήρες, ψεκαστήρες με αισθητήρες). * Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN). ** Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.							

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά	28 ημέρες
Ροδακινιά – Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά	21 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου)	21 ημέρες
Αμυγδαλιά, Κελιφωτό φιστίκι, Καρυδιά, Καστανιά	Δεν ορίζεται λόγω χρόνου εφαρμογής

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: M4

Να γίνεται εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα δράσης

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

48 ώρες


9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής .

10. Συνδυαστικότητα:

11. Κατηγορία Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει τη δραστική ουσία Captan. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

- P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη και εκνεφώματα.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη /φόρτωση και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
SPe1 Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 6 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 180 γραμ./δεκ. σε εδάφη με pH>7,5.
SPe1 Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 300 γραμ./δεκ. και 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 180 γραμ./δεκ. σε εδάφη με pH>7,5.
SPe3 Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P333+ P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος συμβουλευτείτε γιατρό.
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα.
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική

συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 19/01/2026.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 19/06/2026.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 19/06/2026, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 19/12/2025



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας