



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 894 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 23/08/2024, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος,
- την αίτηση με αρ. 5215 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 15/12/2025, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MONALIZA ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4107

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

19/12/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/05/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Monaliza
2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία:
azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,48% β/β
4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία
5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: 1. INDUSTRIAS AFRASA, S.A., Ισπανία
2. Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία
3. BAC d.o.o., Σλοβενία
4. Laboratorios Sirga S.A., Ισπανία
6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. INDUSTRIAS AFRASA, S.A., Ισπανία
2. Albaugh TKI d.o.o., Σλοβενία
3. BAC d.o.o., Σλοβενία
4. Laboratorios Sirga S.A., Ισπανία
7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	40 κ.εκ. – 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	40 κ.εκ. – 300 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου HDPE, Κουτί χάρτινο
3	Δοχείο	2 – 5 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Azoxystrobin
2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97.5% β/β min
3. Παρασκευαστής της δ.ο.: 1. Albaugh Europe Sàrl, Ελβετία
2. CAC Chemical GmbH, Γερμανία
4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: 1. Shangyu Nutrichem Co Ltd, Κίνα
2. CAC Nantong Chemical Co., Ltd, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το MONALIZA είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Έχει και διελασματική κίνηση.

Τρόπος δράσης: αναστολή της μιτοχονδριακής αναπνοής, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και παραγωγής σπορίων και την αναστολή ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

☒

ερασιτέχνες χρήστες

☐

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά την φιάλη και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστικό υγρό αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.ΕΚ. σκ./δεκ. (μέγιστη)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/δεκ.)		
Πατάτα (SOLTU)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i> - ALTESO)	50	20-60	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1 ^{ης} ταξιανθίας έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1 ^{ης} ταξιανθίας (BBCH 51-85)	1-2 / 14 ημέρες
Τομάτα (Θ) (LYPES)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	80	50-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-2 / 10 ημέρες
Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	80-100	30-60	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-2 / 10 ημέρες
<u>Χορήση ήσσονος σημασίας</u> Μελιτζάνα (Θ)* (SOLME)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	80	50-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (οι καρποί να έχουν αποκτήσει το τυπικό για την ποικιλία τους χρώμα) (BBCH 51-89)	1-2 / 10 ημέρες

Αγγούρι (Θ) (CUMSA) Αγγουράκι (Θ) (CUMSG) Κολοκυθάκι (Θ) (CUUPG)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU)	80	50-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-3 / 10 ημέρες
Πεπόνι (Θ) (CUMME) Καρπούζι (Θ) (CITLA) Κολοκύθα (Θ) (CUUPE)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> - SPHRFU)	80	50-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	1-3 / 10 ημέρες
Ψυχανθή: - Μπιζέλια με λοβό (PIBSX) - Μπιζέλια χωρίς λοβό (PIBSX) Όσπρια: - Μπιζέλια (PIBSX)	Ασκοχύτωση (<i>Ascochyta pisi</i> - ASCOPI)	80-100	15-80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 7ου φύλλου/έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 17-72)	1-2 / 10 ημέρες
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u> Σκωρίαση (<i>Uromyces pisi</i> ** - UROMPS)				
Ψυχανθή: - Φασόλια με λοβό (PHSVX) - Φασόλια χωρίς λοβό (PHSVX) - Κουκιά (φρέσκα) (VICFX) Όσπρια: - Φασόλια (PHSVX) - Κουκιά (VICFX)	Ασκοχύτωση (<i>Ascochyta fabae</i> - ASCOFA)	80-100	15-80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 20-79)	1-2 / 10 ημέρες
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u> Σκωρίαση (<i>Uromyces pisi</i> ** - UROMPS)				
<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>	Περωνόσπορος (<i>Peronospora parasitica</i> - PEROPA)	80-100	30-60	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης	1-2 / 10 ημέρες

Μπρόκολο* (BR5OK)				σχηματισμού της κεφαλής έως όπου φθάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής (BBCH 41-48)	
<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u> Αγκινάρα* (CYUSC)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	80-100	30-60	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, όταν έχει αναπτυχθεί το 10% της μέγιστης φυλλικής μάζας μέχρι την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής) (BBCH 41-55)	1-2 / 10 ημέρες
<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u> Λωτός* (DOSKA)	Μυκοσφαίρελα (<i>Mycosphaerella</i> <i>nawae</i> - MYCONA)	80-100	50-100	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH 60-69)	1-2 / 10 ημέρες
Ελαιοκράμβη (BR5NN)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp.- ALTESP)	100	20-40	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων. (BBCH 60-67)	1-2 / 10 -14 ημέρες
Χειμερινό Σιτάρι TRZAW Ανοιξιάτικο Σιτάρι TRZAS	Σκωρίαση (<i>Puccinia</i> spp. - PUCCSP)	100	20-40	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο του καλαμώματος (σχηματισμός 1 ^{ου} κόμβου/ 1 εκ. πάνω από το σημείο του αδελφώματος) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 31-69)	1
Χειμερινό Κριθάρι HORVW Ανοιξιάτικο Κριθάρι HORVS	Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium</i> <i>gramineum</i> - PYRNGR) Σκωρίαση (<i>Puccinia</i> spp. - PUCCSP) Ramularia collo-cygni (RAMUCC)	100	20-40	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο του καλαμώματος (σχηματισμός πρώτου κόμβου/ 1 εκατοστό πάνω από το σημείο του αδελφώματος) έως το τέλος ξεσταχιάσματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας)	1

	Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i> – RHYNSE)			(BBCH 31-59)	
Ρύζι (ORYSA)	Πυρικούλαρια (<i>Pyricularia oryzae</i> - PYRIOR) Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium</i> sp.- HELMSP)	100	20-40	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από το στάδιο φουσκώματος του κολαού μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος (BBCH 41-59)	1
Παρατηρήσεις: 1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα. 2. Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφιναρισμένου λαδιού καλλιέργειας Ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα. 3. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει το Τριπικάλε (TTLSS) και τον Σίτο σπέλτα (όλυρα) (TRZSP). *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Μελιτζάνας (Θ), του μπρόκολου, της Αγκινάρας και του Λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». **«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη Σκωρίαση (<i>Uromyces pisi</i>) στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αγγούρι (θ), Αγγουράκι (θ), Κολοκυθάκι (θ)	3 ημέρες
Τομάτα (θ), Μελιτζάνα (θ), Πιπεριά (θ), Πεπόνι (θ), Καρπούζι (θ), Κολοκύθα (θ),	3 ημέρες
Πατάτα, Αγκινάρα	7 ημέρες
Μπιζέλια με λοβό, Μπιζέλια χωρίς λοβό, Φασόλια με λοβό, Φασόλια χωρίς λοβό, Κουκιά (φρέσκα), Μπρόκολο	14 ημέρες
Ελαιοκράμβη	21 ημέρες
Ρύζι	28 ημέρες
Μπιζέλια (όσπρια), Φασόλια (όσπρια) Κουκιά (όσπρια)	35 ημέρες
Σιτάρι, Τριτικάλε, Σίτος σπέλτα (όλυρα)	Δεν ορίζεται (τελευταία εφαρμογή του προϊόντος στο τέλος της άνθησης (BBCH 69))
Κριθάρι	Δεν ορίζεται (τελευταία εφαρμογή του προϊόντος στο τέλος ξεσταχυάσματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας) (BBCH 59))
Λωτός	Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα τρόπου δράσης - FRAC: Azoxystrobin: 11

- Τηρείτε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών (ανάλογα την καλλιέργεια) ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Αποφεύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές του σκευάσματος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
- Να γίνεται εναλλαγή ψεκασμών, με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Οι εναλλαγές να συνεχίζονται και στις καλλιέργειες που ακολουθούν.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχεσθε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα (6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο).

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας και μελιτζάνας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.
2. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας και μελιτζάνας θερμοκηπίου υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30°C).
3. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

10. Συνδυαστικότητα:

--

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe2: Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να μην εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες της πατάτας, του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή).

SPe3: Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** σε χειμερινές καλλιέργειες σιτηρών.
- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες μπιζελιού, κουκιών (πρώιμη εφαρμογή) και φασολιού (πρώιμη εφαρμογή), αγκινάρας και μπρόκολου
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας (Θ), της μελιτζάνας (Θ), των κολοκυνθοειδών (Θ), της πιπεριάς (Θ), του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή)
- από τα επιφανειακά ύδατα μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων ή 10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την καλλιέργεια του λωτού.
- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη καλλιεργούμενη γη για την καλλιέργεια του λωτού.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό εάν χρειαστεί.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία:19/12/2025.....



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας