

MARIMBA 25 WG

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ

Μυκητοκτόνο-Βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική και αντισποριογόνο δράση.

Δρα σε πολλαπλά σημεία (multi-site activity) παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων.

Εγγραμμένη σύνθεση:

Μεταλλικός χαλκός (Cu): 25% β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού Βοηθητικές ουσίες: 57,33% β/β

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Copper Oxychloride

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε αργά αργά τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος της εφαρμογής.

ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΧΘΡΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ – ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια): για **Περωνόσπορο** (*Plasmopara viticola*). **Δόση** 240-300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο των 7-8 φύλλων μέχρι το στάδιο της έναρξης της ωρίμανσης (BBCH 17-81). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: για **Εξέλκωση βραχιόνων** (*Nectria galligena*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων (BBCH 91-99). Μέχρι **3 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-14 ημέρες για μηλιά και μέχρι **3 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-21 ημέρες για ακλαδία.

ΜΗΛΙΑ: για **Μονιλία** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*), **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Κάντε μια εφαρμογή στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης και άλλη μια κατά το στάδιο της έκπτυξης των σφραγιδιών (BBCH 91-53). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.

ΑΧΛΑΔΙΑ: για **Μονιλία** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*), **Φουζικλάδιο** (*Venturia pyrina*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και άλλη μια κατά το στάδιο της έκπτυξης των σφραγιδιών. Εάν είναι απαραίτητο, συνεχίστε τις εφαρμογές με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση της ασθένειας (BBCH 91- 53). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες. Για **Σεπτορίωση** (*Septoria pyricola*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Κάντε μια εφαρμογή στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 91- 53). Μία **(1) εφαρμογή***.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ: για **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της έκπτυξης των σφραγιδιών (BBCH 91- 53). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΒΥΣΣΙΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: για **Βακτηριακό έλκος** (*Pseudomonas syringae*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων (BBCH 91- 99). Μέχρι **3 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες. Για **Κορύνεο** (*Wilsonomyces carpophilus*), **Μονιλία** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και άλλη μια κατά το στάδιο της έκπτυξης των σφραγιδιών. Εάν είναι απαραίτητο, συνεχίστε τις εφαρμογές με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση της ασθένειας (BBCH 91- 53). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΒΥΣΣΙΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: για **Εξώασκο** (*Taphrina pruni*, *Taphrina wiesneri*, *Taphrina deformans*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και άλλη μια κατά το φρούσκωμα των σφραγιδιών. Εάν είναι απαραίτητο, συνεχίστε τις εφαρμογές με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση της ασθένειας (BBCH 91- 53). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.

ΚΕΡΑΣΙΑ, ΒΥΣΣΙΝΙΑ: για **Κυλινδροσπορίωση** (*Blumeriella jasprii*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και άλλη μια κατά το φρούσκωμα των σφραγιδιών. Εάν είναι απαραίτητο, συνεχίστε τις εφαρμογές με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση της ασθένειας (BBCH 91- 53). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΝΕΡΑΤΖΙΑ, ΛΙΜΕΤΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΠΙ ΦΡΟΥΤ: για **Αλτερνάρια** (*Alternaria citri*), **Φυτόφθορα** (*Phytophthora citrophthora*, *Phytophthora hibernalis*, *Phytophthora citricola*, *Phytophthora syringae*, *Phytophthora nicotianae* var. *parvica*), **Βακτηρίωση** (*Pseudomonas syringae*). **Δόση** 300-400 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/δεκ. Εφαρμογές από το στάδιο της έκπτυξης των πρώτων φύλλων μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης του καρπού. Ξεκινάτε τις εφαρμογές το φθινόπωρο, όταν η θερμοκρασία πέφτει και σημειώνονται οι πρώτες έντονες βροχοπτώσεις. Όπου είναι απαραίτητο, επαναλάβετε ανά 3-4 εβδομάδες όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός (BBCH 15-89). Μέχρι **3 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-14 ημέρες.

ΕΛΙΑ: για **Κερκασπορίωση** (*Cercospora cladosporioides*), **Γλοιωσπόριο** (*Colletotrichum acutatum*, *Glomella cingulata*), **Φουζικλάδιο** (*Fusicladium oleagineum*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 70-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογές από το στάδιο της έκπτυξης των πρώτων φύλλων μέχρι το στάδιο της αλλαγής του χρώματος του καρπού. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο, προληπτικά, πριν να σημειωθούν οι πρώτες βροχοπτώσεις. Εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας, επαναλάβετε σε 3 εβδομάδες (BBCH 10-85). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 21 ημέρες.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: για **Βακτηρίωση** (*Pseudomonas syringae*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων (BBCH 91-99). Μέχρι **3 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες. Για **Κορύνεο** (*Wilsonomyces carpophilus*), **Εξώασκο** (*Taphrina deformans*), **Μονιλία** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και άλλη μια κατά το φρούσκωμα των σφραγιδιών. Εάν είναι απαραίτητο, συνεχίστε τις εφαρμογές με άλλα εγκεκριμένα προϊόντα για την αντιμετώπιση της ασθένειας (BBCH 91- 53). Μέχρι **2 εφαρμογές*** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14-21 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου, Θερμοκνήσιου): για **Περωνόσπορο** (*Phytophthora infestans*), **Αλτερνάρια** (*Alternaria solani*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές, προληπτικά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Από την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού (BBCH 15-89). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P337+313** Εάν δεν υποχωρεί ο σφραγματικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401



UFI: DE50-60Y0-0003-H55Y

ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. **H319** Προκαλεί σοβαρό σφραγματικό ερεθισμό. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUN401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά – Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Iorδάνη Σουκκιούρογλου 4 (πρώην Ολύμπου 4),
Βιομηχανική Ζώνη Λασιών, Λευκωσία 2234,
Ταχυδρομική Θυρίδα 12508,
Λασιά Λευκωσία 2250, Κύπρος
Tηλ: 22 815 353,
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

Αρ. Παρτίδας (Batch No) & Ημ. Παραγωγής (Man. Date):
Βλέπε συσκευασία

L\MARIMBA25WG\10KG\CY\1

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου, Θερμοκνήσιου): για **Περωνόσπορο** (*Phytophthora nicotianae* var. *nicotianae*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές, προληπτικά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Από την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού (BBCH 15-89). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΠΙΠΕΡΙΑ (Υπαίθρου*, Θερμοκνήσιου): για **Περωνόσπορο** (*Phytophthora capsici*), **Αλτερνάρια** (*Alternaria solani*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές, προληπτικά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Από την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού (BBCH 15-89). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΠΑΠΟΥΤΣΙ (Υπαίθρου, Θερμοκνήσιου), ΠΑΤΑΤΑ (Υπαίθρου, Θερμοκνήσιου), ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υπαίθρου): για **Περωνόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*). **Δόση** 200 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές, προληπτικά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Εφαρμογές που αρχίζουν από την έκπτυξη των κοτυληδόνων μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού (BBCH 10-89). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΣΚΟΡΔΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΑΣΚΑΛΛΗΝΙΟ (Υπαίθρου): για **Περωνόσπορο** (*Peronospora destructor*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές, προληπτικές εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5^{ου} φύλλου μέχρι την ωρίμανση του βολβού (BBCH 14-47). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου, Θερμοκνήσιου), ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙΑ/ΣΚΑΡΟΛΕΣ (Υπαίθρου), ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙΑ (Θερμοκνήσιου): για **Περωνόσπορο** (*Bremia lactucae*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές, προληπτικά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Εφαρμογές από την εμφάνιση του 2^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 12-49). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ: για **Περωνόσπορο** (*Phytophthora infestans*). **Δόση** 300 γρ.σκ./δεκ.(μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή 3 εφαρμογές, προληπτικά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την εμφάνιση των πρώτων καρπιδίων (BBCH 15-85). Μέχρι **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα αν εφαρμοστεί σε κρύο ή βροχερό καιρό. **2.** Στην περίπτωση του φουζικλαδίου και της μονιλίας της μπανάνας η ποικιλία «Golden Delicious», να κάνει εφαρμογές μόνο κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης. **3.** Σε δαμασκηνίες, αμυγδαλιές, κερασιές, βερικοκίες, βυσσινιές και ροδακινιές, λόγω πιθανής φυτοτοξικότητας, μην εφαρμόζετε ποτέ αυτό το προϊόν μετά την άθιση των δέντρων. **4.** Κατά την εφαρμογή στο στάδιο της διάγκωσης των σφραγιδιών της ροδακινιάς, χρησιμοποιήστε μεγάλες ποσότητες διαλύματος, αλλά αποφυγείτε τον ψεκασμό με υψηλή πίεση για να μην αποκολληθούν οι σφραγίδες. **5.** Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες chili peppers. **6.** Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκού των σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά δέκαρο (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

* Στην καλλιέργεια της μηλιάς, ακλαδίας, δαμασκηνιάς, κερασιάς, βερικοκιάς, βυσσινιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, αμυγδαλιάς και ελιάς δεν θα πρέπει οι εφαρμογές να ξεπερνούν τις τέσσερις (4) συνολικά, ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ): Αρνέλι (επιτραπέζια, οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες. **Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Νερατζιά, Λιμετία, Λεμονιά, Γκρέπ φρουτ, Ελιά:** 14 ημέρες. **Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπέρι (Υ&Θ):** Για μεταποίηση: 10 ημέρες. Για νωπή κατανάλωση: 3 ημέρες. **Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Μαρούλι (Υ&Θ), Πλάτυφυλλα αντίδια/Σκαρολές (Υ& Θ), Πατάτα:** 7 ημέρες. **Ιαγυούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Υ&Θ), Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλλήνιο, Αμυγδαλιά:** 3 ημέρες. **Μηλιά, Αχλαδιά, Ιαπωνική μουςμουλιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Βυσσινιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμυγδαλιά: --**

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διακρίσιμη ανθεκτικότητα: Ομάδα τρόπου δράσης: **copper oxychloride: M01** Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω από τη φυλλική επιφάνεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας (ασκούλες) μαζί με τα κομμάτια που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκόσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυησάμετε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιούν το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P264** Πλένετε σχολαστικά τα χέρια μετά τη χρήση. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. **P501** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. *Φοράτε γάντια, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και προστασία για τα μάτια, κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρ- τωσης και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επανεισόδου στον αγρό ή το θερμοκήπιο μετά την εφαρμογή να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.*

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. **SPe1** Για να προστατέψετε τους οργανισμούς στο έδαφος μην χρησιμοποιείτε αυτό η οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει χαλκό, σε ετήσια συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από 400 γραμ. χαλκό/δεκ. **SPe3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις, για τις καλλιέργειες των μηλοειδών, πυρηνοκάρπων και της αμυγδαλιάς. **SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα: **• 10 μέτρων** για την καλλιέργεια αμπελιού, πιπεριάς, τομάτας, αντιδιού, μαρούλιού, σκόρδου, κρεμμυδιού, ασκαλωνίου, πατάτας, μελιτζάνας, πεπονηίου, καρπουζιού, κολοκύθας, αγγουριού, κολοκυθιού. **• 20 μέτρων** για τις καλλιέργειες ελιάς, εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, Ιαπωνικής μουςμουλιάς και αμυγδαλιάς. **Spe8** Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονία- σης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των τζιζανιών. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν



5 290770 1008763



Καθαρό Βάρος: **10kg**