

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά την φιάλη και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστικό υγρό ανοδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανόδευση.

ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΑΤΑΤΑ για *Alternaria solani*. Δόση 50 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1ης ταξινόμησης έως τον μετακρομμιασμό των καρπών της 1ης ταξινόμησης (BBCH 51-85). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ για *Leveillula taurica*. Δόση 80 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ανθοδέρας, από την εμφάνιση της πρώτης ταξινόμησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΠΕΠΟΝΙΑ για *Leveillula taurica*. Δόση 80-100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξινόμησις έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΜΕΛΙΤΙΣΑ (Θ) *Χρήση ήσσονος σημασίας, για *Didymo*. Δόση 80 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Θ), ΠΕΠΟΝΙ (Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Θ) για *Sphaerotheca fuliginea*. Δόση 80 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Μια (1) - τρεις (3) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΨΥΧΑΝΘΗ (ΜΠΕΣΛΙΑ ΜΕ ΛΟΒΟ, ΜΠΕΣΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΒΟ), ΣΠΙΡΙΑ (ΜΠΕΣΛΙΑ) για *Ascochyta blight* (Ascochyta blight), *Σκωρίαση* (χρήση ήσσονος σημασίας)(Uromyces pisi). Δόση 80-100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 15-80 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 7ου φύλλου/έλικα έως του 20% των λοβών έως φθάσει το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 17-72). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.**

ΨΥΧΑΝΘΗ (ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΛΟΒΟ, ΦΑΣΟΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΒΟ, ΚΟΥΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ), ΣΠΙΡΙΑ (ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΟΥΚΙΑ) για *Ascochyta blight* (Ascochyta blight), *Σκωρίαση* (χρήση ήσσονος σημασίας)(Uromyces pisi). Δόση 80-100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 15-80 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 20-79). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.**

ΜΠΡΟΚΟΛΙ*Χρήση ήσσονος σημασίας, για *Peronospora parasitica*. Δόση 80-100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής έως φθάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής (BBCH 41-48). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΑΓΚΙΝΑΡΙΑ*Χρήση ήσσονος σημασίας, για *Didymo*. Δόση 80-100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, όταν έχει αναπτυχθεί το 10% της μέγιστης φυλλικής μάζας μέχρι την εμφάνιση της σταθεράς (κεφαλής) (BBCH 41-55). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΛΟΤΟΣ*Χρήση ήσσονος σημασίας, για *Mycosphaerella nanae*. Δόση 80-100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH 60-69). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες.

ΕΛΑΙΟΚΑΡΦΗ για *Alternaria* spp.). Δόση 100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 60-67). **Μια (1) - δύο (2) εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΠΑΡΙ, ΑΝΘΙΣΤΙΚΟ ΣΠΑΡΙ για *Puccinia* spp.). Δόση 100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το στάδιο του καλαμώματος (σχηματισμός του κόμβου/ 1 εκ. πάνω από το σημείο του αδελφώματος) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 31-69). **Μια (1) εφαρμογή.**

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΡΗΒΑΡΙ, ΑΝΘΙΣΤΙΚΟ ΚΡΗΒΑΡΙ για *Helminthosporium graminum*), *Σκωρίαση* (Uromyces pisi), *Ramularia collo-cygni*, *Puccinia* spp.). Δόση 100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το στάδιο του καλαμώματος (σχηματισμός του κόμβου/ 1 εκ. πάνω από το σημείο του αδελφώματος) έως το τέλος ζεστακούσματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας (BBCH 31-59). **Μια (1) εφαρμογή.****

ΡΥΖΙ για *Puccinia* spp.). Δόση 100 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη) με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας, από το στάδιο φυοσκώματος του καλέου μέχρι το τέλος του ζεστακούσματος (BBCH 41-59). **Μια (1) εφαρμογή.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα. 2. Μπορεί να παρατηρηθεί διαφθορά στην τσιγέρη του ραφινάρισμένου λαδιού καλλιέργειας Ελαιοκαρφής στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα. 3. Η χρήση στο αντίστοιχο περιβάλλον το Τρικλάτο (TILSS) και τον λίτρο (όλυο) (TRZSP).

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Μελιτζάνιας (Θ), του Μπρόκολου, της Αγκινάρας και του Λιατού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη Σκωρίαση (Uromyces pisi) στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κοκκία (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κοκκία (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος*.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τη συνείδησή του. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣ:** Μεταφέρετε το πάθοντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό εάν χρειαστεί. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπασκε σκεύασμα. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΗΤΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405 + P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

P501 Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράτευσης από τις λιθοστρώσεις επιφανείας και τους δρόμους).

SPe2 Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να μην εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες της πατάτας, του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουρκιών (όψιμη εφαρμογή).

SPe3 Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφηστέ από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** σε χειμερινές καλλιέργειες αιτών.

- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες μιτζελιού, κουρκιών (πρώιμη εφαρμογή) και φασολιού (πρώιμη εφαρμογή), αγκινάρας και μπρόκολου.

- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας (Θ), της μελιτζάνας (Θ), των κολοκυνθοειδών (Θ), της πιπεριάς (Θ), του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουρκιών (όψιμη εφαρμογή).

- από τα επιφανειακά ύδατα μια απέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων ή 10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% για την καλλιέργεια του λωτού.

- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελαιокράμβης.

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφηστέ μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη καλλιεργούμενη γη για την καλλιέργεια του λωτού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ): 3 ημέρες. Πατάτα, Αγκινάρα: 7 ημέρες. **Μιτζελία χωρίς λοβό, Φασόλια με λοβό, Φασόλια χωρίς λοβό, Κουκιά (φρέσκα), Μπρόκολο:** 14 ημέρες. **Ελαιοκράμβη:** 21 ημέρες. **Ράπτι:** 28 ημέρες. **Μπιτζελία (όψιμη), Φασόλια (όψιμη), Κουκιά (όψιμη):** 35 ημέρες. **Σιτάρι, Τριτικάλε, Σίτος σπέλτα (όλυρα):** Δεν ορίζεται (τελευταία εφαρμογή του προϊόντος στο τέλος της άνοιξης (BBCH 69). **Κριθάρι:** Δεν ορίζεται (τελευταία εφαρμογή του προϊόντος στο τέλος Εξαστάματος 1 πλήρης έκπτυξη της ταξιάνης)(BBCH 59). **Λιωτές:** Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΤΡΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διακρίνεται ανθεκτικότητα: Ομάδα τρόπου δράσης – FRAC: Azoxystrobin: 11

- Τηρείτε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών (ανάλογα την καλλιέργεια) ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Αποφεύγετε τις συνεκτικές εφαρμογές του σκευάσματος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
- Να γίνεται εναλλαγή ψεκασμών, με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Οι εναλλαγές να συνεχίζονται και στις καλλιέργειες που ακολουθούν.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μην εισέρχεστε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα (6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΩΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας και μελιτζάνας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.
2. Να μην χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια τομάτας και μελιτζάνας θερμοκηπίου υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30°C).
3. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (να νερά του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποδογυρίσουν σε ένα σημείο συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μέσα όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιούν το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής απόδοσης ή χρήσης.

MONALIZA

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Το MONALIZA είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Έχει και διελασματική κίνηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Αναστολή της μιτοχονδριακής αναπνοής, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και παραγωγής σπορίων και την αναστολή ανάπτυξης μυκήλιου του μύκητα.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH208** Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H) -one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. **EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Άδειας: 4107

Εγγραμμένη σύνθεση:

Azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,48% β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Κάτοχος της Άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά – Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Ισθμίων Σουκιούρογλου 4 (πρώην Ολύμπου 4), Βιομηχανική Ζώνη Λατσιών, Λευκωσία 2234, Ταχυδρομική Θυρίδα 12508, Λατσιά Λευκωσία 2250, Κύπρος
Τηλ: 22 815 353
contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy



**Αρ. Παρτίδας (Batch No) &
Ημ. Παραγωγής (Man. Date):**
Βλέπε συσκευασία



Περιεχόμενο: 5lt



**Premier
Shukuroglou**