

RAKAN

600SL

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Άδειας: 4164

Εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα χειμερινά και ανοιξιότικα σιτηρά.

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και από τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών, προκαλώντας τη νέκρωση των ζιζανίων.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

2,4-D 60% β/ο

(υπό μορφή 2,4-D άλατος διμεθυλαμίνης 72,24 % β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 49,25% β/β

Πυκνό διάλυμα (SL)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



5lt



**Premier
Shukuroglou**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό/δέκ., μικρό τύπου σκούπας, χαμηλή πίεση και υπό συνεχή ανόδευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του ακευασματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανόδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανόδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Ανοϊξιάτικο σιτάρι, Ανοϊξιάτικο κριθάρι, Ανοϊξιάτικη σίκαλη, Ανοϊξιάτικη βρώμη για Πλάτυφυλλα ζιζάνια με δόση 150κ.εκ./δέκ. μέγιστη και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/δέκ. Μεταφυτρωτικός ψεκασμός από τα 3 φύλλα της καλλιέργειας έως το στάδιο όπου ο δεύτερος κόμβος είναι 2 εκ. από τον πρώτο. (BBCH 13-32). Μία (1) εφαρμογή.

Χειμερινό σιτάρι, Χειμερινό κριθάρι, Χειμερινή σίκαλη, Χειμερινή βρώμη, Τριτκάλες για Πλάτυφυλλα ζιζάνια με δόση 125κ.εκ./δέκ. μέγιστη και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/δέκ. Μεταφυτρωτικός ψεκασμός από την αρχή του αεθλοφυμώματος έως το στάδιο όπου ο δεύτερος κόμβος είναι 2 εκ. από τον πρώτο. (BBCH 21-32). Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης (έως τα 20-30 εκ. ύψος).

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αναγallis (Anagallis arvensis), λουβουδιά (Chenopodium album), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Γεράνι (Geranium dissectum).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Παπαρούνη (Papaver rhoeas).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΥΤΩΕΥΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Σιτάρι, Τριτκάλες, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη: Μν εφαρμοζόμνη, καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του ακευασματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Μνν εφαρμοζόμνη το ακεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό συνθήκες στρες (ξηρασία, ασθένειες, κ.λπ.). - Ν μνν εφαρμόζεται όταν φυσάει για να αποφευχθεί η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. - Μνν εφαρμόζεται το προϊόν παρουσία πάχους ή όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 21°C. - Μνν εφαρμόζεται το προϊόν σε υγρά φύλλαμνα. - Μνν εφαρμόζεται όταν βρέχει και για διάστημα 6 ωρών από βροχή.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - HRAC: 4

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΪ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μνν εισέρχεται στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:---

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταπονηθούν προηγούμενες με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστειθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αρ. Παρτίδας (Batch No) :
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date):

L/RAKAN600SL/SLT/CY/1



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUΗ208 Περιέχει 2,4-D υπό μορφή άλατος διμεθυλινής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUΗ401 Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: 5WEM-EPWV-WF0V-JEJ1

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405 + P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264 Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. **P270** Μνν τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικό ενδύματα. «Φοράτε προστατευτικό γάντιο, ολόσωμο φόρμα εργασίας και μέσα στομιακή προστασία για τα μάτια, κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή, φοράτε μακρυμάνικο ποκάμνη και μακρύ παντελόνι.» Για την προστασία των περιούκων και των περιουρικόμενων πρέπει να αμύκασκη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** και χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1 Μνν ριπνίετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μνν πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κατά σε επινωλευτικό ύδατο. Να απορριπθεί η ριπίσην μέρη του συστήματος αποδέχεταις από τις λήδωρτες επιφάνειες και τους δρόμους). **Sp2** Για να προστατέμειτε τους υδρόβιους οργανισμούς, στο χειμερινό σιτάρι, να μνν εφαρμόζεται το ακεύασμα σε τεκνιά αποξηραμμένημνα εδάφη και σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 4%. **Sp3** Για να προστατέμειτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αμύκασκη ζώνη προστασίας από το επιφανειακό ύδατο: - **20 μέτρων ή 10 μέτρων** σε ανδυσάμνη με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στα **χειμερινά σιτάρι**. - **10 μέτρων ή 5 μέτρων** σε ανδυσάμνη με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στο **ανοϊξιάτικη σιτάρι**. **Sp3** Για να προστατέμειτε τα φυτά μη στόκους να αφήσετε μίαν αμύκασκη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική ή χρησιμοποείταις ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% στα **χειμερινά σιτάρι** και ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στα **ανοϊξιάτικη σιτάρι**.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P301+P312+P330 Σε **ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιασάφεια. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P305+P351+P338 Σε **ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Απενερίστε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επάρση είναι εύκολη. Ξεπλένετε να ξεπλένετε. **P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή έναν γιατρό. Σε **ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε **ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα ρούχα εργασίας.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: 1401

Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem Espana S.L.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Tηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία

E: contact@premier.com.cy

www.premier.com.cy



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

