



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 5157 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 08/10/2025, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**SWITCH 62.5WG**..... ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

1963

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

15/03/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/09/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Switch 62,5WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

Fludioxonil: 25% β/β

Cyprodinil: 37,5 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 35,8% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Exwold Technology Limited, UK
2. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Italy

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
2. Exwold Technology Limited, UK
3. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Italy

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	100γρ., 120γρ., 150γρ., 160γρ., 200γρ., 240γρ., 250γρ., 300γρ., 400γρ., 500γρ., 600γρ., 625γρ., 800γρ.,	Σακούλες από αλουμίνιο και πολυαιθυλένιο μέσα σε κουτί χάρτινο ή κονσέρβα από πεπιεσμένο χαρτί
2.	Σακούλα με εσωτερική επένδυση	1Kg, 1,2Kg, 1,25Kg, 1,5Kg , 2Kg, 2,5 Kg, 3Kg, 4Kg, 5Kg, 10Kg 20Kg και 45 Kg	Σακούλα με εσωτερική επένδυση paper/polyethyleneterephthalate/aluminium/p olyethylene, με το προϊόν σε απευθείας επαφή με το στρώμα από polyethylene
3.	Δοχείο		High density polyethylene

Γ) i) Δραστική ουσία...1

1. Κοινή Ονομασία: Fludioxonil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection Monthey SA, Ελβετία
Fine Organics Limited, UK

Γ) ii) Δραστική ουσία 2

1. Κοινή Ονομασία:

Cyprodinil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

99% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection Monthey SA, Ελβετία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (fludioxonil) και ενός διασυστηματικού (cyprodinil) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Τα φαινυλοπυρρολικά (fludioxonil) προκαλούν βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων. Οι ανιλινοπυριμιδίνες (cyprodinil), παρεμποδίζουν την απέκκριση λυτικών ενζύμων από τα παθογόνα.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Ξανακαθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό 3 φορές, από όλα τα υπολείμματα, διαλύοντας με καθαρό νερό και ρίχνοντας τα νερά του ξεπλύματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα. / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, Σταφίδα)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>) Ασπέργιλλος (<i>Aspergillus sp.</i>)	80 – 100	80 – 100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την άνθηση έως την ωρίμανση των ραγών. (BBCH 60-88)	1
	Βοτρυτής (<i>Botrytis sp.</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	80 – 100	80 – 100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την άνθηση της 7 ^{ης} ταξιανθίας για τη τομάτα/ 7 ^ο άνθος για την μελιτζάνα έως και την πλήρη ωρίμανση όλων των καρπών. (BBCH 67-89)	3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα
Πιπεριά (Υ & Θ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis sp.</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	80 – 100	80 – 100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση του 5ου ανθοφόρου οφθαλμού έως και την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 55-89)	3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα
	Βοτρυτής (<i>Botrytis sp.</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	80 – 100	80 – 100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από τον σχηματισμό των πρώτων καρπών έως να αποκτήσουν το τυπικό σχήμα και μέγεθος. (BBCH 71-79)	3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα
Κολοκυνθοειδή Αγγούρι Κολοκύθι Αγγουράκι για τουρσί (Υ & Θ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis sp.</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	80 – 100	80 – 100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από το στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη της ρίζας. (BBCH 14-49)	2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα.
Καρότο (Υ)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria sp.</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	100	80	80		

Φινόκιο (Μαραθόριζα) (Υ)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria sp.</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	100	80	80	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έκπτυξη του 4ου φύλλου έως το στάδιο που έχει αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος. (BBCH 14-49)	2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.
Κρεμμύδι ξηρό Σκόρδο Ασκαλώνια (Υ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis squamosa</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	120	80	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση του 10ου φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 10% των φυτών έχουν πλαγιαίσει. (BBCH 20-47)	3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.
	Βοτρυτής (<i>Botrytis squamosa</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	120	80	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση του 10ου φύλλου έως όπου το φυτό αποκτήσει το 70% του τελικού μήκους και διαμέτρου. (BBCH 20-47)	3 εφαρμογές για το βοτρυτή και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.
Μαρούλι Σαλάτα Αντίδι Αρωματικά φυτά (Υ & Θ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sp.</i>)	60	100	60	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έκπτυξη του 1ου φύλλου έως το στάδιο όπου οι κεφαλές έχουν αποκτήσει το τυπικό τους σχήμα και μέγεθος. (BBCH 11-49)	3 εφαρμογές με 10-21 ημέρες μεσοδιάστημα.
	Στεμφύλιο (<i>Stemphylium botryosum</i> , <i>Stemphylium vesicarium</i>) Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	100	100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως τη συγκομιδή. (BBCH 61-89)	2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα στο θερμοκήπιο και 1 εφαρμογή για την ύπαιθρο
Φράουλα (Υ & Θ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum sp.</i>)	125	80	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων στο βάθος της ροζέτας έως το τέλος της συγκομιδής. (BBCH 55-89)	

Φασολάκι με λοβό (Υ & Θ)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> sp.) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum</i> sp.)	100	100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλμών έως τον πλήρη σχηματισμό των λοβών. BBCH 51-79	2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.
Όσπρια (φασόλια)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> sp.) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum</i> sp.)	100	100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως το στάδιο όπου το 40% των λοβών έχουν φθάσει το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 61-74)	2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα
Μηλοειδή: Μήλα Αχλάδια Κυδώνια	Σήψεις καρπών: Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium</i> sp.) Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>) Πενικίλιο (<i>Penicillium</i> sp.) Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> sp.) Φαϊά σήψη (<i>Monilia</i> sp.) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum</i> sp.) Φουζικλάδιο (<i>Venturia</i> sp.) Εξέγκωση βραχιόνων (<i>Nectria</i> sp.) Φουζάριο (<i>Fusarium</i> sp.)	80 – 100	100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως το στάδιο της συγκομιδής τους. (BBCH 81-87)]	3 εφαρμογές με 6-10 ημέρες μεσοδιάστημα

	Μετασυλλεκτικές ασθένειες Φουζικλάδιο (<i>Venturia sp.</i>) Εξέγκωση βραχιόνων (<i>Nectria sp.</i>) Φαϊά σήψη (<i>Monilia sp.</i>)	80 – 100	100	100	Προληπτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών ασθενειών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως το στάδιο της συγκομιδής τους (BBCH 81-87)]	
Ροδακινιά Νεκταρίνια Βερικοκιά	Φαϊά σήψη (<i>Monilia sp.</i>)	60 – 100	100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση τους. (BBCH 81-89)]	2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.
Κεράσια	Φαϊά σήψη (<i>Monilia sp.</i>)	60 – 100	100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από το ροζ μπουμπούκι έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων (BBCH 57-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση τους. (BBCH 81-89)]	2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα

Δαμάσκηνα	Φαιά σήψη (<i>Monilia</i> sp.)	60 – 100	100	100	Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. [Πρώτη εφαρμογή από την έναρξη έως το τέλος της άνθησης- πτώση πετάλων (BBCH 61-69) & τελευταία εφαρμογή από την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση τους. (BBCH 81-89)]	3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.
Καπνός	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> sp.)	---	60	60	Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της άνθησης. (BBCH 51-89)	2 με μεσοδιάστημα 14ημέρες
Ανθοκομικά: Ανεμώνη Μπιγκόνια Κυκλάμινο Βιόλα Βιολέτα Πελαργόνιο Πρίμουλα Τριαντάφυλλο Γαρύφαλλο Χρυσάνθεμο Φίκος Μπένζιαιμιν Ζέρμπερα Πανσές Γεράνι Εξάκον Ορτανσία Αζαλέα Γυσοφίλη Κάκτοι παχύφυτα Λυσσιάνθος	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>) Ασπέργιλλος (<i>Aspergillus</i> sp.)	100	100	100	Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. (BBCH 14-67)	3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Βιβούνιο σε πλαστικά τούνελ Ντιόσμα σε πλαστικά τούνελ Γκιουλθέρια Ίλεξ Παιόνια (Y+Θ)								
Βατόμουρα* (Y+Θ) Σμέουρα* (Y+Θ) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας)	<i>Rhabdospora ruborum</i> <i>Leptosphaeria coniothyrium</i> Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) Μαύρη σήψη (<i>Dydimmella applanata</i>)	100	20-100	100		Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έναρξη της άνθησης έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 61-89)	3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.	
Σπανάκι* (Y+Θ) (Χρήσεις ήσσονος σημασίας)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> sp.)	60	100	60		Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Από την έκπτυξη του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το στάδιο πριν την έκπτυξη της ανθικής καταβολής. (BBCH 11-49)	3 εφαρμογές για το βοτρύτη και 2 εφαρμογές για τη σκληρωτίνια με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα	
Ακτινιδιά* (Χρήσεις ήσσονος σημασίας)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	80-160 **	50-100	80		Από την έναρξη της άνθησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 60-69)	2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα	
* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες βατόμουρων, σμέουρων και σπανακιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. ** Όταν χρησιμοποιείτε χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού, να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση σκευάσματος ανά δεκάριο.								

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Σπαρράγι	6 μήνες
Ακτινιδιά	120 ημέρες
Όσπρια (φασόλια)	28 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	21 ημέρες
Ασκαλώνια (Υ), Φασολάκι με λοβό (Υ), Σκόρδο (Υ)	14 ημέρες
Αμπέλι επιτραπέζιο, Αντίδι (Υ+Θ), Αρωματικά φυτά (Υ+Θ), Βατόμουρα (Υ+Θ), Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Καπνός, Καρότο (Υ), Κεράσια, Κρεμμύδι ξηρό (Υ), Κρεμμύδι φρέσκο (Υ), Φινόκιο (Μαραθόριζα) (Υ), Μαρούλι (Υ+Θ), Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Σαλάτα (Υ+Θ), Σμέουρα (Υ+Θ), Σπανάκι (Υ+Θ)	7 ημέρες
Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι για τουρσί (Υ+Θ), Αχλαδιά, Κολοκυθιά (Υ+Θ), Κυδωνιά, Μηλιά, Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Φασολάκι με λοβό (Θ)	3 ημέρες
Φράουλα (Υ)	2 ημέρες
Φράουλα (Θ)	1 ημέρα
Ανθοκομικά	Δ.Ο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Fludioxonil – 12
Cyprodinil – 9**

Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συνίσταται οι εφαρμογές με SWITCH 25/37.5 WG, να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες, τις φαινυλοπυρρόλες και τα δικαρβοξυμιδικά.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μην εισέρχετε στη ψεκάσμενη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια


9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Για την καλλιέργεια του μαρουλιού και των λοιπών καλλιεργειών της κατηγορίας αυτής π.χ. σαλάτα, αντίδι κ.λ.π. η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 60 γρ./σκευάσματος/δεκάριο προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας σε ευαίσθητες ποικιλίες

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος. Περιέχει cyprodinil.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405 + P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
- Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- SP1** Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά ύδατα / Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
- SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε από τα επιφανειακά νερά για τις δενδρώδεις καλλιέργειες:
- μίαν ασέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** εκ των οποίων, τα **10 μέτρα** θα είναι ζώνη φυτικής ανάσχεσης (VFS) για τις καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού, αγγουριού για τουρσί, καρότου, κρεμμυδιού ξηρού και νωπού, σκόρδου, ασκαλώνιας, σπαραγγιού, φράουλας, φασολακιού (με και χωρίς λοβό), φασολιών:
 - μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης (VFS) **10 μέτρων**

για το αμπέλι, σμέουρα, βατόμουρα και τα ανθοκομικά φυτά:

- μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων**

για το ακτινίδιο:

- μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** ή **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

SPe3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήνετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά-μη στόχους να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **3 μέτρων** από μη γεωργική γη για το ακτινίδιο.

Spo2 Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείτε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

P302+352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε επισκεφτείτε γιατρό.

P362+364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C.


ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα σακουλάκια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 19/03/2026



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα