



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4779 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 04/04/2025, για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
..... **ORONDIS EVO 25/1.2 SC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4195

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

26/09/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

03/03/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: ORONDIS EVO 25/1.2 SC

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

azoxystrobin 25 % β/ο oxathiapiprolin 1,2% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 75,2 % β/β
--

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Syngenta Crop Protection AG, Basel Ελβετία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Chemark ZRT, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία 2. Syngenta Limited, Grangemouth, Ηνωμένο Βασίλειο
--

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Chemark ZRT, Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία 2. Syngenta Limited, Grangemouth, Ηνωμένο Βασίλειο 3. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
--

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	200 κ.εκ. έως και 1 λίτρο	HDPE, HDPE/PA
2	Δοχείο	1 έως και 20 λίτρα	

Γ) i. Δραστική ουσία 1

1. Κοινή Ονομασία: azoxystrobin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96,5 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Syngenta Crop Protection AG, Basel, Ελβετία 2. CAC CHEMICAL GmbH, Hamburg, Γερμανία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Syngenta Limited, Grangemouth, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Saltigo GMBH, Leverkusen, Γερμανία
3. CAC Nantong Chemical Co., Ltd, Jiangsu, Κίνα

Γ) ii. Δραστική ουσία 2

1. Κοινή Ονομασία: oxathiapiprolin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Corteva Agriscience International Sarl, Versoix, Ελβετία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Saltigo GMBH, Leverkusen, Γερμανία
2. Allessa GmbH, Alt-Fechenheim, Γερμανία
3. Allessa GmbH, Standort Höchst, Γερμανία
4. Corteva Agriscience Spain S.L., Asturias, Ισπανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Η δ.ο. azoxystrobin έχει διασυστηματική και μερικώς διελασματική δράση. Παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου, την παραγωγή και βλάστηση των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Σε βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας. Η δ.ο. oxathiapiprolin εμφανίζει τοπικά διασυστηματική δράση και κινείται διελασματικά μέσω του ξυλώματος. Δρα ως ρυθμιστής δέσμευσης της οξυστερόλης (OSBP) στα κύτταρα των μυκήτων διαταράσσοντας κυτταρικές λειτουργίες όπως η σηματοδότηση, η διατήρηση των κυτταρικών μεμβρανών και ο σχηματισμός λιπιδίων που είναι απαραίτητα για να επιβιώσουν τα κύτταρα των μυκήτων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα διεξοδικά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιέργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα. / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη	κ.εκ./ 10.000 τ.μ. φυλλικής επιφάνειας (LWA)*		
Τομάτα (Θερμοκηπίου) (LYPES)	Περωνόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)	20 - 100	100	500	Προληπτικός ψεκασμός φυλλώματος. <u>- Σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη</u> από την έκπτυξη του 1 ^{ου} παραγματού φύλλου έως τη συγκομιδή (BBCH 11-89). <u>- Σε αποστραγγιζόμενα εδάφη</u> από την έκπτυξη του 1 ^{ου} παραγματού φύλλου έως την ωρίμανση του 10% των καρπών (BBCH 11-81)	2 / 7 ημέρες
	Σιδίο <i>Oidium neolycopersici</i> (OIDINL) <i>Leveillula taurica</i> (LEVETA)					
Αγγούρι (Θερμοκηπίου) (CUMSA) Κολοκύθι (Θερμοκηπίου) (CUUPG) Πεπόνι (Θερμοκηπίου) (CUMME) Καρπούζι (Θερμοκηπίου) (CITLA)	Περωνόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> (PSPECU) Μαύρη σήψη <i>Didymella bryoniae</i> (DIDYBR)	20-100	100	500	Προληπτικός ψεκασμός φυλλώματος. <u>- Σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη:</u> από την έκπτυξη του 1 ^{ου} παραγματού φύλλου έως τη συγκομιδή (BBCH 11-89). <u>- Σε αποστραγγιζόμενα εδάφη:</u> από την έκπτυξη του 1 ^{ου} παραγματού φύλλου έως την ωρίμανση του 10% των καρπών (BBCH 11-81)	2 / 7 ημέρες
	Περωνόσπορος <i>Bremia sp.</i> (BREMSP)					
Μαρούλι (Θερμοκηπίου) (LACSA)		20-80	100	-	Προληπτικός ψεκασμός φυλλώματος. <u>- Σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη:</u> από την έκπτυξη του	2 / 7 ημέρες

	Βοτρυτής <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)					1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το φυτό αποκτήσει το τυπικό του μέγεθος και μορφή (BBCH 11-49) <u>- Σε αποτραννιζόμενα εδάφη:</u> από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την έκπτυξη του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου (BBCH 09-13)				
Παρατηρήσεις: - Η χρήση στο Μαρούλι περιλαμβάνει τα Κατσαρά Μαρούλια, Μαρούλια Σαλάτες, Κεφαλωτά Μαρούλια και Κοινά Μαρούλια. - Η χρήση στην τομάτα περιλαμβάνει τα τοματίνια (PHYGR). - Σε γραμμικά συστήματα φύτευσης/ καλλιέργειας κάθετης ανάπτυξης, για την εφαρμογή της βέλτιστης δόσης σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, να γίνεται υπολογισμός της δόσης ανά δεκάριο λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της καλλιέργειας (ύψος βλάστησης και απόσταση μεταξύ των γραμμών) και τη δόση LWA ως εξής:										
** Δόση LWA: <u>Τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο = (LWA/100.000) x Δόση LWA (από τον ανωτέρω πίνακα).</u> όπου LWA= 2 x (ύψος βλάστησης (μέτρα) x 10.000/ απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα))										
Για λαχανοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου: Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σταύρωμα μέχρι την κορυφή της βλάστησης. Η Δόση LWA είναι σταθερή (500 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά δεκάριο αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 100 κ.εκ. ανά δεκάριο. Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά δεκάριο:										
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)	Ύψος βλάστησης (μέτρα)									
		0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	
	0,75	33	67	100	100	100	100	100	100	
	1	25	50	75	100	100	100	100	100	
	1,25	20	40	60	80	100	100	100	100	
	1,5	17	33	50	67	83	100	100	100	
2	13	25	38	50	63	75	88	100		

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα (Θ), Τοματίνια (Θ), Αγγούρι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθι (Θ)	3 ημέρες
Μαρούλι (Θ), Κατσαρά μαρούλια (Θ), Μαρούλια σαλάτες (Θ), Κεφαλωτά μαρούλια (Θ), Κοινά μαρούλια (Θ)	14 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα τρόπου δράσης - FRAC: azoxystrobin: 11
Oxathiapiprolin: 49**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία azoxystrobin, που ανήκει στην ομάδα 11 των μυκητοκτόνων QoI κατά FRAC και τη δραστική ουσία oxathiapiprolin, που ανήκει στην ομάδα 49 των μυκητοκτόνων OSBPI κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να ακολουθείτε τις παρακάτω υποδείξεις και ότι είναι πιο περιοριστικό κατά περίπτωση:

- Να εφαρμόζετε το ORONDIS EVO 25/1.2 SC προληπτικά.
- Να χρησιμοποιείτε το ORONDIS EVO 25/1.2 SC σε εναλλαγή με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες διαφορετικής διασταυρούμενης ανθεκτικότητας με υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι των ίδιων παθογόνων.
- Να χρησιμοποιείτε το ORONDIS EVO 25/1.2 SC σε εναλλαγή με σκευάσματα που δεν περιέχουν δραστικές ουσίες των ομάδων 11 και 49 κατά FRAC.
- Οι ψεκασμοί με ORONDIS EVO 25/1.2 SC ή με όποιο σκεύασμα περιέχει δ.ο. της ομάδας 49 κατά FRAC δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 33% των ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστο αριθμό εφαρμογών τους 1 ή 2 (ανάλογα της καλλιέργειας και του εδάφους) για το ORONDIS EVO και τους 4 συνολικά με σκευάσματα που περιέχουν δ.ο. της ομάδας 49 κατά FRAC.
- Να μην υπερβαίνετε τον 1 ψεκασμό με ORONDIS EVO 25/1.2 SC (ή με οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει δ.ο. της ομάδας 49 κατά FRAC) όταν απαιτούνται λιγότεροι από 3 ψεκασμοί στο σύνολο για την αντιμετώπιση ωομυκήτων ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Απαγορεύονται οι ψεκασμοί φυλλώματος με ORONDIS EVO 25/1.2 SC (ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει δ.ο. της ομάδας 49 κατά FRAC), όταν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί επενδυτικό σπόρων ή έχει εφαρμοστεί στο έδαφος σκεύασμα που περιέχει δ.ο. που ανήκει στην ομάδα 49 κατά FRAC.
- Για την αντιμετώπιση ασθενειών σε καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου: όταν χρησιμοποιείτε μυκητοκτόνα που περιέχουν δ.ο. της ομάδας 11 κατά FRAC (QoI) σε μείγμα με δραστική ουσία άλλης ομάδας, μην υπερβαίνετε το 50% του συνολικού αριθμού των ψεκασμών ή τις 6 εφαρμογές με μυκητοκτόνα της ομάδας 11 (εφαρμόζοντας το λιγότερο κατά περίπτωση). Μην υπερβαίνετε τις 3 διαδοχικές επεμβάσεις με σκευάσματα που περιέχουν δ.ο. της ομάδας 11.
- Για την αντιμετώπιση ασθενειών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κολοκυνθοειδών και μαρουλιού: χρησιμοποιείτε το μέγιστο μία εφαρμογή με ORONDIS EVO (ή με οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει δ.ο. της ομάδας 11 κατά FRAC) στις 3 εφαρμογές με μυκητοκτόνα ανά καλλιεργητική περίοδο. Χρησιμοποιείτε το μέγιστο 3 εφαρμογές με σκευάσματα που περιέχουν δ.ο. της ομάδας 11 ανά καλλιέργεια. Μην χρησιμοποιείται μυκητοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ομάδας 11 διαδοχικά, συνεχίστε την εναλλαγή και στις καλλιέργειες που ακολουθούν.
- Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε φυτώρια παραγωγής σποροφύτων για μεταφύτευση.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν το σκεύασμα έχει στεγνώσει πλήρως από τη φυλλική επιφάνεια.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Το ORONDIS EVO 25/1.2 SC περιέχει τη δ.ο. azoxystrobin που προκαλεί φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Για το λόγο αυτό κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να προσεχθεί η διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που γειτνιάζουν με μηλιές. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή με ORONDIS EVO 25/1.2 SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

10. Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει εξεταστεί η συνδυαστικότητα.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Συστήνεται η χρήση γαντιών.»

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμανικό πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείτε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από ήλιο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 26/09/2025



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας