

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:
2,0% β/β ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)
1,0% β/β οργανικό άζωτο (Norg) φυτικής προέλευσης από αμινοξέα
1,0% β/β αμιμονικό άζωτο (N)
3,2 % β/β ΟΛΙΚΟ ΠΕΝΤΟΞΕΙΜΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P₂O₅)
2,84% β/β πεντοξείδιο του φωσφору (P₂O₅) υδατοδιαλυτό
3,0% β/β πεντοξείδιο του φωσφору (P₂O₅) διαλυτό σε ουδέτερο κινιτικό αμμώνιο
2,3% β/β ΟΞΕΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K₂O) υδατοδιαλυτό
3,55% β/β Οργανικός άνθρακας (Corg)
20,0% β/β Σηρό ουσία
940g/Kg φυτικού βιοδιεγέρτη

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ:
Αμινοξέα φυτικής προέλευσης* 50% β/β (CAS No 100209-45-8)
Διήθημα από φύκια *Ascophyllum nodosum** 44% β/β (CAS No 84775-78-0)
PK 3-2, 3 (Φωσφορικό μονοκάλιο) (CAS No 7778-77-0)
*ΚΣΥ1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών

Το Carbo XL συμβάλλει στη βελτίωση πολλών ποιοτικών παραμέτρων, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Καλλιέργεια | Δόση εφαρμογής | Όγκος νερού | Τρόπος εφαρμογής | Στάδιο εφαρμογής | Αριθμός εφαρμογών | Ισομερές | Αποτελεσμα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Ξυλώδη πολυετή φυτά* & Λαχανικά, Καλλωπιστικά και Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά**

– με **δόση** 1,8 L/ha και όγκο νερού 300 – 1200 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 15 έως 87, **3 έως 4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει την περιεκτικότητα των φυλλών σε χλωροφύλλη, σύμφωνα με την αξιολόγηση SPAD

– με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 300 – 1200 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 15 έως 87, **3 έως 4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει την περιεκτικότητα των φυλλών σε χλωροφύλλη, σύμφωνα με την αξιολόγηση SPAD, Αυξάνει την απόδοση (t/ha)

ΣΥΛΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΥΤΑ: με **δόση** 1,8 – 3 L/ha και όγκο νερού 300 – 1200 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 15 έως 85, **3 έως 4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει την περιεκτικότητα των φυλλών σε χλωροφύλλη, σύμφωνα με την αξιολόγηση SPAD, Αυξάνει τον αριθμό των ραγών ανά ταρσί, Αυξάνει το βάρος των ραγών (g), Βελτιώνει τον αριθμό των καρπών ανά ταρσί/άνθη, Αυξάνει τον αριθμό των εμπορεύσιμων καρπών ανά δέντρο, Αυξάνει τη διάμετρο των καρπών (mm), Αυξάνει τη σκληρότητα των καρπών (kg/cm²), Βελτιώνει την περιεκτικότητα σε σάκχαρα (°Brix), Αυξάνει την απόδοση (t/ha).

Πρόσθετοι ισχυρισμοί για ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες

ΜΗΛΙΑ: με **δόση** 1,8 – 3 L/ha και όγκο νερού 400 – 1200 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 69 έως 73, **3 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Βελτιώνει τον αριθμό των ταρσιών/άνθη με καρπούς ανά δέντρο.

ΑΜΠΕΛΕ: με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 300 – 1000 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 15 έως 85, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει τον αριθμό των ταρσιών/άνθη ανά φύλλο.

Πρόσθετοι ισχυρισμοί για Λαχανικά, Καλλωπιστικά, Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 500 – 1000 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 63 έως 87, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει τη διάμετρο των καρπών (mm), Αυξάνει τον αριθμό των πρώτης κατηγορίας καρπών, Αυξάνει την απόδοση των καρπών πρώτης κατηγορίας (t/ha).

ΤΟΜΑΤΑ:
– με **δόση** 1,8 L/ha και όγκο νερού 500 – 1000 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 71 έως 84, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει την περιεκτικότητα των φυλλών σε χλωροφύλλη, σύμφωνα με την αξιολόγηση SPAD, Αυξάνει τη διάμετρο των καρπών (mm), Αυξάνει τον αριθμό των πρώτης κατηγορίας καρπών, Αυξάνει την απόδοση των καρπών πρώτης κατηγορίας (t/ha).

– με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 500 – 1000 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 71 έως 84, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει τη συνολική απόδοση των καρπών (t/ha).

ΑΓΓΟΥΡΕ: με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 500 – 1000 L/ha, Ψεκασμός φυλλώματος, Στάδιο εφαρμογής BBCH 71 έως 87, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει το μήκος των καρπών (cm).

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 1000 – 3000 L/ha, Ξεπλύνση άρδευσαν, Στάδιο εφαρμογής BBCH 63 έως 87, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει τη διάμετρο των καρπών (mm), Αυξάνει τον αριθμό των πρώτης κατηγορίας καρπών, Αυξάνει την απόδοση των καρπών πρώτης κατηγορίας (t/ha).

ΚΑΠ 7 Ξυμεικτο προϊόν λίπασμα
ΚΑΠ 6(B) Mh
μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών με
ΚΑΠ 1(T)(III) Υγρό οργανο-ανόργανο λίπασμα
N-P-K 2-3-2-2-3



Carbo XL®
μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

Φυσική μορφή: Υγρό



Το Carbo XL είναι ένα υγρό εκχύλισμα φυκιών για ψεκασμό με τεχνολογία GoActive, το οποίο συνδυάζει επίσης ένα σύμπλεγμα φυτικών αμινοξέων, σχεδιασμένο να ενισχύει το σύνθεση πρωτεϊνών. Εφαρμόζεται για να βοηθήσει τα φυτά στην ανάπτυξη τους και να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν εξωτερικούς παράγοντες.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1lt



Premier Shukuroglou

Πρόσθετοι ισχυρισμοί για Λαχανικά, Καλλωπιστικά, Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά
ΤΟΜΑΤΑ: με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 1000 – 3000 L/ha, Ξεπλύνση άρδευσαν, Στάδιο εφαρμογής BBCH 71 έως 84, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει την περιεκτικότητα των καρπών σε σάκχαρα (°Brix).
ΑΓΓΟΥΡΕ: με **δόση** 3 L/ha και όγκο νερού 1000 – 2000 L/ha, Ξεπλύνση άρδευσαν, Στάδιο εφαρμογής BBCH 71 έως 87, **4 εφαρμογές**, Ποιότητα χαρακτηριστικά, Αυξάνει την περιεκτικότητα των φυλλών σε χλωροφύλλη, σύμφωνα με την αξιολόγηση SPAD, Αυξάνει το μήκος των καρπών (cm).

*Ξυλώδη πολυετή φυτά = αμύγδαλο, μηλιά, βερβερκό, σφικάντο, δάφνη, μύρτιλο, μαύρη σταφίδα, βατόμουρο, βελανιδιά, κόπρη, cheptoyga, κρασάτι, εσπεριδοειδή, κακάοδέντρο, καφέδέντρο, cranberry, φύλλα κόρυ, χουρμής, σιμπούκος, σικιά, αμπέλι, γκουβιά, φουντουκιά, λυκίσκος, αρμυρίκι, λάιμ, κωφίρι, ακτινίδιο, γλυκίσκος, loganberry, μάνγκο, μούσμουλο, μοσχοκάρυδο, νεκταρίνι, ελιά, παπάγια, passion fruit, ροδάκινο, σιάδι, λωτός, φυσιδικό, δροσιστικό, ροδάκινο, βατόμουρο, κόκκινη σταφίδα, τριανταφυλλιά, τσίτα, καρδιά.

** Λαχανικά, καλλωπιστικά και αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά = αγγελική, γλυκάνισος, σπαράγγι, μελιτζάνα, μελιόχορτο, μπανάνα, βασιλικός, μπράκολο και καλαμπρέζε, λαχανάκια Βρυξελλών, κρεμμύδι βολβός, ψωρό, λάχανο (κραμπι), γαιδομαργαρίτο, καρτό, κουνουπίδι, σέλερι ρίζα, σέλερι, φύλλα σέλερι (άγριο κύμινο και σιτακόρατο), μωράνι, βελγικό αντίδι, τσίλι, κινέζικο λάχανο, σκάνοπρασσο, chui sui, Λαχανικά, κολιανδρό, κολοκύθια και κολοκαρινό κολοκύθι, κάρδαμο, αγγούρι, σπίνθος, βρώμη άνηθ, βρώμη φύλλα μωστράδος, αντίδι, φινόκιο, άνηθ και λουλούδια για γέμισμα, σκόρδο, αγγουράκι τουρού, αγκινάρα, χιτριό ραπανάκι (khorasandish), αγκινάρα Ιερουσαλήμ, λαχανάκια και ιταλική λαχανάκια, κουλκούρα, λυκοτριβόλο, μαύρο κάρδαμο, πέρσο, μαρούλι, λεβιστικό, μαντζουράνα, πεπόνι, δόρυσος, μαϊνάρια, ρίγανη, άλλα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μωστράδος, παστινάκι, φυσιδικό, πιπέρι, σανάρι, κολοκύθια και χειμερινό κολοκύθι, ανράκλα, ραπανάκι, κόκκινο παντζάρι, ραβέντι, ρόκα, νεντρολίβανο, κρόκος, φακόμηλο, κρεμμύδακι φρέσκο, λαγόχορτο, θραυπί, θαλασσοκρέμνη, σκάνοπρασσο, σπανάκι, φράουλα, rutabaga, sweet cicely, σέσκουλο, εστραγκόν, θυμάρι, τομάτα, γογγύλι, βανίλια, νεροκάρδαμο, καρπούζι.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ειδικές καλλιέργειες (Ξυλώδη πολυετή + Λαχανικά, καλλωπιστικά και αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά): από BBCH 15 έως 87 = από ανάπτυξη φυλλών έως ωριμότητα καρπών.
Ξυλώδη πολυετή φυτά: από BBCH 15 έως 85 = από ανάπτυξη φυλλών έως ωριμότητα καρπών.
Μηλιά: από BBCH 69 έως 73 = τέλος ανθοφορίας και στη συνέχεια έως 10 ημέρες.
Αμπέλι: από BBCH 15 έως 85 = 5 φύλλα / πριν την ανθοφορία / καρπόδεση / 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
Λαχανικά, καλλωπιστικά, αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά: από BBCH 63 έως 87 = από ανθοφορία έως ωριμότητα καρπών. Νομάτια & αγγούρι: από BBCH 71 έως 84-87 = πρώτοι μικροί καρποί και στη συνέχεια έως 10 ημέρες.

Na χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αναγκαρισμένη ανάγκη.

Mην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση εφαρμογής.

Για εφαρμογές με χαμηλό όγκο νερού, διασφαλίστε καλή κάλυψη της καλλιέργειας με κατάλληλο εξοπλισμό.

Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν από κάθε χρήση.

ΣΥΜΒΑΤΗΤΗΤΑ: Πριν από τη χρήση σε μίγμα εντός δεξαμενών, συμβουλευτείτε πάντα και ακολουθήστε τις οδηγίες του αναγκαριστικού προϊόντος. Σε περίπτωση μείγματος, είναι ευθύνη του χρήστη να δοκιμάσει το μείγμα πριν από την εφαρμογή. Το Carbo XL να τοποθετείται τελευταίο στο δοχείο.

ΠΑΡΗΟΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: P102 – ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Για να ασφαλιστούν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, συμμορφωθείτε με τις συνιστώμενες οδηγίες σχετικά με τη λήψη ουσίας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣ: ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΤΗΡΗΣΙΑΣ: 1401

ΣΥΝΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Φυλάσσεται μόνο στο πρωτότυπο δοχείο, σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης ή άμεσο ηλιακό φως. Κρατάστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αρ. Παρτίδας (Batch No) & Ημ. Παραγωγής (Man. Date):
Βλέπε συσκευασία

Ημερομηνία λήξης: 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

Παρασκευαστής:
Laboratoires Goëmar S.A.S
Parc Technopolis Atalante CS
41 908, 35435 Saint Malo, France

Διανομέας:
Premier Shukuroglou
Cyprus Ltd
Tηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy



L/CARBOXL/ILT/CY/1

