



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 267 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 16/06/2025, για την τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τις συσκευασίες τους σκευάσματος,
- την αίτηση με αρ. 5301 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 31/03/2026, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ..DICARZOL 50SP.. ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2777

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

15/02/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/09/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Gowan Crop Protection Limited

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Dicarzol 50SP

2. Μορφή: Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:
formetanate: 50% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 45,6% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Gowan Crop Protection Limited

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SBM-Formulation C.S.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα μέσα σε κουτί	50γρ., 80γρ., 100γρ., 150γρ., 200γρ., 250γρ., 300γρ., 350γρ., 400γρ., 500γρ., 700γρ., 800γρ., 1Kg, 1.5Kg, 2Kg, 2.5Kg, 5Kg, 10Kg	Σακούλα PET/AL/PE μέσα σε χάρτινο κουτί
2.	Σακούλα		Σακούλα πολυαιθυλενίου με εξωτερική επένδυση PET/AL/PE αεροστεγώς κλεισμένη και τυπωμένη με τις σχετικές οδηγίες

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: formetanate

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 91% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Gowan Crop Protection Limited

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Aventis CropScience GmbH
2. Sunko Ink Co., Ltd

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

☒

ερασιτέχνες χρήστες

☐

3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια)	Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp</i>)	125	80	100	Εφαρμογή στην έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 63-64) φροντίζοντας να διαβρεχτεί προσεκτικά η ζώνη των ταμπιών. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης	1
		100	100	100	Εφαρμογή στην πτώση πετάλων (BBCH 67). Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης	1
Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου)	Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips spp</i>)	125	80	100	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής.	1
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Pumpkins) (Υπαίθρου)		100	100	100	Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 21 μέρες. Ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.	2 με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες

Μαρούλι Αντίδι (Υπαίθρου)	Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp</i>)		200	50	100	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων. BBCH 14-15	1
	Φράουλα (Υπαίθρου)		100	100	100		
Τριανταφυλλιά Γαρυφαλλιά Χρυσάνθεμο Ζέρμπερα (υπαίθρου & θερμοκηπίου)	Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips spp</i>)		100	100	100	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής	1

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα, Μελιτζάνα, Φράουλα	14 ημέρες
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό	3 ημέρες
Αμπέλι, Μαρούλι, Αντίδι, Καλλωπιστικά Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια	Μη εφαρμόσιμο (ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 1A

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας

10. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από αλκαλικές ενώσεις και το θείο

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS06



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P321 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην ξεπλένετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά στα επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση διαμέσου αγωγών αυλακιών και αρδευτικών καναλιών.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα, για όλες τις καλλιέργειες

SPe3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**, για όλες τις καλλιέργειες

SPe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα-επικονιαστές να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Σε κάθε περίπτωση οι μελισσοκόμοι της περιοχής θα πρέπει να ειδοποιηθούν πριν την εφαρμογή

ΕΥΗ 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P301+310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P305+P351+ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Αν τα συμπτώματα παραμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Το συνιστώμενο αντίδοτο είναι θειϊκή ατροπίνη εφαρμοζόμενη με ένεση (2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μην χρησιμοποιείτε 2-PAM.

Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Η τιμολόγηση του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 23/05/2026.
2. Η τελική διάθεση, αποθήκευση και χρήση από τους γεωργούς του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα επιτρέπεται μέχρι 23/10/2026.
3. Όσο αφορά τις ποσότητες του σκευάσματος που ήδη υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τις 23/10/2026, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για την νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα. Νοείται ότι, όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
4. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 23/04/2026.....



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα