



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 911 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 23/10/2024, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα στοιχεία του Κατόχου της άδειας,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **METAWET PRO** ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3248

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

27/03/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

YOU Solutions Germany GmbH
Seligmannallee 1, D-30173 Hannover, Germany

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuruglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuruglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Metawet Pro

2. Μορφή: Κοκκώδες δόλωμα (GB)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:
metaldehyde: 3,04 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 96,96 % β/β
(Περιέχει πικραντικό παράγοντα)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arxada AG

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Arxada AG

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., Μάνδρα Αττικής
3. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σάκοι	3.5 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 15 kg, 16 kg, 20 kg και 25 kg	Χάρτινες σακούλες

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: metaldehyde

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98,5% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Arxada AG

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Arxada AG

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Δρα δια επαφής και στομάχου. Μετά από λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν την κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόζεται απ' ευθείας στο έδαφος ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους είτε με λιπασματοδιανομέα, είτε με μηχανοκίνητο διανομέα κοκκώδων σκευασμάτων.
Σε μικρή έκταση εφαρμογής επιτρέπεται η εφαρμογή του με το χέρι

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις κ.εκ./δεκ. μέγιστη	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
Σιτηρά (Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριπλάλε, Σιτάρι)	Σαλιγκάρια Γυμνοσάλιαγκες	0.7	Κατά την έναρξη της προσβολής ή όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα μέχρι το τέλος του αδερφώματος	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
			Κατά την έναρξη της προσβολής ή όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα στο στάδιο της ροζέτας-αρχή σχηματισμού στελέχους	
			Κατά την έναρξη της προσβολής ή όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα μέχρι το σχηματισμό ροζέτας με εκπτυγμένα 9 ή περισσότερα φύλλα	
			Επιφανειακή εφαρμογή επί του εδάφους όταν οι γυμνοσάλιαγκες είναι σε δραστηριότητα αφού εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα και όταν οι κόνδυλοι έχουν φθάσει στο 50% του τελικού μεγέθους	
Ζαχαρότευτλα				
Πατάτα				
Παρατηρήσεις: 1. Για την παρακολούθηση της προσβολής και την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου προσβολής συνιστάται η χρήση ειδικών παγίδων.				

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **ΜΟ**

- Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.
- Να εφαρμόζεται με υγρό καιρό όταν τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες είναι περισσότερο δραστήρια.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Κρατήστε τα πουλερικά από την περιοχή εφαρμογής για τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την εφαρμογή

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Φοράτε πάντοτε γάντια κατά την χρήση. Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι (σε περίπτωση μη ετοιμόχρηστου σκευάσματος). Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

SP1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe6 Για την προστασία των πουλιών και των άγριων ζώων, απομακρύνετε όσο προϊόν έχει χυθεί.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μετά από επαφή με το δέρμα, ξεπλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικής αντίδρασης συμβουλευθείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και πιείτε μετά άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό και θερμοκρασία περιβάλλοντος <35 °C

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 27/03/2026



.....
Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας