



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 270 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 07/07/2025, για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τη χρήση του προϊόντος στη Βιολογική Γεωργία,
- την αίτηση με αρ. 5296 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 17/03/2026, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **SOLFOXIDANTE** ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3652

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

15/04/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/07/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

AZYFRERA Y FERTLIZANES PALLARES (AFEPASA)

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Solfoxidante

2. Μορφή: Σκόνη Επίπασης (DP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Sulphur: 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Azufrera Y Fertilizantes Pallarés S.A.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Azufrera Y Fertilizantes Pallarés S.A.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Azufrera Y Fertilizantes Pallarés S.A.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	1Kg,	σακούλα αλουμινίου
2	Σάκος	5Kg, 10Kg και 25Kg	Χαρτόσακος τριών στρώσεων με εσωτερική στρώση πολυαιθυλενίου
3	Μεγάλοι Σάκοι	250Kg και 500Kg	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: sulphur

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 990 g/kg min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Repsol Lubricantes y Especialidades SA (RYLESA)

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Repsol Lubricantes y Especialidades SA (RYLESA)

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Ακαρεοκτόνο και Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Με επίπαση, ως έχει

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κιλά/ δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι	Ωίδιο Ακάρεα	2 – 3	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης (στάδιο 5-8ου φύλλου) μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης BBCH 15-80 Κατά το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 10-19) μόνο μία εφαρμογή επιτρέπεται	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Πεπόνι Καρπούζι (Υπαίθρου)	Ωίδιο Ακάρεα	2 – 3	Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της καλλιέργειας.	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 5 – 10 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου)				
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου)	Ωίδιο Ακάρεα	2		3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι, Πεπόνι, Καρπούζι, Τομάτα, Καλλωπιστικά	M.E

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **M2**

Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.

Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C

Μην εφαρμόζετε παραφινέλαια για 21 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του.

Μην εφαρμόζετε στις καλλιέργειες εάν τα φρούτα προορίζονται για κονσερβοποίηση

- Καταλληλότητα χρήσης του προϊόντος για τη Βιολογική Γεωργία (Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2018/848):

❖ Η χρήση του επιτρέπεται στη Βιολογική Γεωργία

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

10 ημέρες για το αμπέλι

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102 + P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο και σταθερά υποδήματα.

P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** για το αμπέλι, **5 μέτρων** για την καλλιέργεια του πεπονιού, καρπουζιού, τομάτας και καλλωπιστικών μικρότερων από 50εκ. και **10 μέτρων** για τομάτες και καλλωπιστικά μεγαλύτερα από 50εκ.,

Spe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων . Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την

περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν

ΕΥΗ 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.

P337+313: Εάν ο ερεθισμός εμμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό Αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C και προστατευόμενο από παγωνιά. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής τους.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντλησης αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα.
2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 23/04/2026...



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας