



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 1097 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 06/02/2026, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τις συσκευασίες (υλικό) και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **SCORE 25EC** ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2311

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

29/05/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/03/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λεωφόρος Ανθούσας Αττικής, Τ.Κ. 15349, Ελλάδα

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Score 25EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Difenoconazole: 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 74,92% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Chemark ZRT, Peremarton-Gyartelep, Ουγγαρία
2. Schirm GmbH Schonebeck, Γερμανία
3. Syngenta Production France S.A.S., Aigues-Vives, Γαλλία
4. Phyteurop SA, Montreuil-Bellay, Γαλλία
5. SBM Formulation, Béziers Cedex, Γαλλία
6. Syngenta South Africa (Pty) Limited, Brits, Νότια Αφρική
7. Syngenta Chemicals B.V., Seneffe, Βέλγιο

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Οινόφυτα, Ελλάδα
2. Chemark ZRT, Peremarton-Gyartelep, Ουγγαρία
3. Schirm GmbH Schonebeck, Γερμανία
4. Syngenta Production France S.A.S., Aigues-Vives, Γαλλία
5. Phyteurop SA, Montreuil-Bellay, Γαλλία
6. SBM Formulation, Béziers Cedex, Γαλλία
7. Syngenta South Africa (Pty) Limited, Brits, Νότια Αφρική
8. Syngenta Chemicals B.V., Seneffe, Βέλγιο

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες / Μπιτόνια	10 κ.εκ. έως 20 Λίτρα	HDPE HDPE-PA f-HDPE HDPE/EVOH

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Difenconazole

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94% min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Syngenta Crop Protection AG

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:
1. Syngenta Crop Protection AG, Monthey, Ελβετία
2. Deccan Fine Chemicals (India) Private Ltd,
Payakaraopeta Mandal, Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το Score 25EC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
Περιέχει το δραστικό συστατικό Difenconazole (τριαζόλη) που κινείται δεαλασματικά και έχει προληπτική δράση.
Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, λαχανικά, φράουλα, πατάτα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι κ.α

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του **SCORE 25 EC** και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχανήμα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν/ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Μηλιά (MABSD)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN)	15 – 20	100 – 150	30	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) BBCH 61-84	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
	Αχλαδιά (PYUCO) Μουσμουλιά (MSPGE) Κυδωνιά (CYDOB)	15 – 20	100 – 150	30	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) BBCH 61-84	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Βερικοκιά (PRNAR)	Φαία σήψη (<i>Monilia</i> sp. - MONISP) Ωίδιο (<i>Sphaerotheca</i> sp. - SPHRSP)	20 – 30	100 – 150	45	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας BBCH 60 μέχρι 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
	Δαμασκηνιά (PRNDO) Κερασιά (PRNCE)	20	100 – 150	30	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας έως τα φρούτα να είναι ώριμα για συγκομιδή BBCH 60-87	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες

Ροδακινιά (PRNPS)	Φαία σήψη (<i>Monilia</i> sp. - MONISP) Ωίδιο (<i>Sphaerotheca</i> sp. - SPHRSP) Εξώασκος (<i>Taphrina</i> sp. - TAPHSP) <u>Χρήση ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Φώμοψη* (<i>Fusicoccum amygdale</i> - FUSCAM)	20 – 30	100 – 150	45	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας BBCH 60 μέχρι 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Ελιά (OLVEU)	Κυκλοκόνιο (<i>Cycloconium</i> sp. - CYCLSP) <u>Χρήσεις ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* (<i>Colletotrichum</i> <i>gloeosporioides</i> - COLLGL), <i>Colletotrichum</i> <i>acutatum</i> - COLLAC), <i>Colletotrichum</i> <i>clavatum</i> - COLLCL) Κερκόσπορα* (<i>Pseudocercospora</i> <i>cladosporioides</i> - CERCCL)	50 – 60	80	50	Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους, ξεκινάει η σκλήρυνση του πυρήνα (παρουσιάζει αντίσταση στην απόσπαση) έως την ανάπτυξη του τυπικού χρωματισμού του καρπού BBCH 75-85	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ωίδιο (<i>Erysiphe necator</i> - UNCINE) Μαύρη σήψη (<i>Guignardia bidwellii</i> - GUIGBI)	12- 20	100	20	Ψεκασμός φυλλώματος από την εμφάνιση του 2ου φύλλου έως το στάδιο του μαλακώματος των ραγών BBCH 12-85	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες

Φράουλα (FRAAN) (Θερμοκηπίου και υπαίθρου)	Ωίδιο (<i>Podosphaera</i> sp. - PODOSP)	50	50 – 100	50	ψεκασμός φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη συγκομιδή BBCH 51-89	Υπαίθρου: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες Θερμοκηπίου: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Σμέουρα (RUBFR) Βατόμουρα (RUBID)	Ωίδιο (<i>Podosphaera</i> sp. - PODOSP) Δρεπανοπεζίζα (<i>Drepanopeziza</i> sp.- DREPSP) Μαύρη σήψη (<i>Didymella</i> sp.- DIDYSP) Σκωρίαση (<i>Phragmidium</i> sp.- PHRASP)	30 – 40	50 – 100	40	ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανάπτυξης των βλαστών έως την έναρξη του φουσκώματος των ανθοφόρων και φυλλοφόρων σφαλμών BBCH 31-49	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Τομάτα (LYPES) (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Ωίδιο (<i>Leveillula</i> sp.- LEVESP) Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium</i> sp.- CLADSP)	50	50 – 100	50	ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή BBCH 20-87	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (CUMME) Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (CITLA) Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (CUMSA) Κολοκύθι (Υπαίθρου και	Ωίδιο (<i>Erysiphe</i> sp. - ERYSSP) <i>Sphaerotheca</i> sp. - SPHRSP)	50	50 – 100	50	ψεκασμός φυλλώματος <u>Υπαίθρου:</u> Από την εμφάνιση των πρώτων θηλικών ανθών έως τη συγκομιδή BBCH 51-86 <u>Θερμοκηπίου:</u> Από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή BBCH 21-89	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 ημέρες

Θερμοκηπίου)(CUUPG)								
Αγκινάρα (CYUSC)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Έλκος (<i>Leptosphaeria maculans</i> - LEPTMA) Μυκοσφαίρελλα (<i>Mycosphaerella</i> sp.- MYCOSP) Ωίδιο (<i>Erysiphe</i> sp. - ERYSSP) <i>Leveillula</i> sp. - LEVESP)	50	50 – 100	50		Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας έως το 60% της μέγιστης φυλλικής μάζας BBCH 40-46	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες	
Χρήση ήσσονος σημασίας: Αμυγδαλιά** (PRNDU)	Φαϊά σήψη (<i>Monilia</i> sp. – MONISP)	--	80-90	45		Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 69-79	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες	
Χρήση ήσσονος σημασίας: Φιστικιά** PIAVE	Βοτρυοσφαίρια (<i>Botryosphaeria</i> sp. - BOTSSP)	--	80-90	45		Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 69-79	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες	
Χρήση ήσσονος σημασίας: Καρυδιά** (IUGRE)	Ανθράκωση (<i>Colletotrichum</i> sp. - COLLSP) Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium</i> sp. - CLADSP)	--	80-90	45		Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 69-79	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες	

Χρήση ήσσονος σημασίας: Καστανιά** (CSNSA)	Φαϊά σήψη (<i>Gnomoniopsis castaneae</i> - GNMPCA)	--	80-90	45	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 69-79)	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
Κουνουπίδι (BRSOB) Λάχανο (Κραμπι) (BRSOL)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Μυκοσφαϊρέλλα <i>Mycosphaerella brassicicola</i> - MYCOBR)	50	50 – 100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους BBCH 40-46	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Μπρόκολο (BRSOK)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Ωίδιο (<i>Erysiphe</i> sp. - ERYSSP) Έλκος (<i>Leptosphaeria maculans</i> - LEPTMA) Μυκοσφαϊρέλλα <i>Mycosphaerella brassicicola</i> - MYCOBR)	50	50 – 100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους BBCH 40-46	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Μαϊντανός (PARCR) (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Σεπτόρια (<i>Septoria</i> sp. - SEPTSP) Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i> - ERYSHE), <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP)	50	50 – 100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού BBCH 40	Υπαίθρου: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες Θερμοκηπίου: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες

Σέλερι (APUGD) (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Σεπτόρια (<i>Septoria</i> sp.- SEPTSP)	50	50 – 100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο διόγκωσης της βάσης των φύλλων έως όπου το φυτό φτάσει στο τυπικό του μέγεθος BBCH 40 – 49	Υπαίθρου: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες Θερμοκηπίου: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
Κρεμμύδι (ALLCE) Σκόρδο (ALLSA)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Σκωρίαση (<i>Puccinia allii</i> - PUCCAL)	50	50 – 100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη έως τη λήξη της βολβοποίησης BBCH 40 – 49	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12 ημέρες.
Πράσο (ALLPO)					Ψεκασμός φυλλώματος από έναρξη της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου φυτικού μέρους έως το μήκος και η διάμετρος του βλαστού να φτάσουν το τυπικό τους μέγεθος BBCH 40 – 49	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12 ημέρες
Σπαράγγι (ASPSS)	Σκωρίαση (<i>Puccinia</i> sp. - PUCCSP) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium</i> sp.- STEMSP)	--	50 – 100	50	Όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως τη συγκομιδή BBCH 41-89	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
Πατάτα (SOLTU) Γλυκοπατάτα (IPOBA)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP)	--	50 – 100	60	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως τη συγκομιδή BBCH 40-85	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Ζαχαρότευτλα (BEAVA) Παντζάρι (γογγυλόριζα) (BEAVX)	Κερκοσπορίωση (<i>Cercospora beticola</i> - CERCBE) Ραμουλάρια (<i>Ramularia beticola</i> - RAMUBE) Ωίδιο (<i>Erysiphe betae</i> - ERYSBE)	--	50 – 100	40 – 50	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο που τα φύλλα καλύπτουν το 10% της επιφάνειας του εδάφους έως τα τεύτλα/παντζάρια φτάσουν το τελικό μέγεθος για συγκομιδή BBCH 31-49	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 21 ημέρες

	Σκωρίαση (<i>Uromyces betae</i> - UROMBE)					
Όσπρια: - Ξηρά φασόλια (PHSVX) - Φακές (LENCU) - Ρεβίθι (CIEAR) - Λούπινα (LUPAL)	Ασκοχύτωση (<i>Ascochyta pisi</i> - ASCOPI) Μυκοσφαιρέλλα (<i>Mycosphaerella</i> sp. - MYCOSP)	--	40 – 50	40	ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης ως τη συγκομιδή BBCH 51-79	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 21 ημέρες
Μελιτζάνα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (SOLME) Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (CPSAN)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Ωίδιο (<i>Leveillula</i> sp. - LEVESP)	50	50 – 100	50	ψεκασμός φυλλώματος από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή BBCH 20-87	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες
Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSOF)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Ωίδιο (<i>Erysiphe</i> sp. - ERYSSP) Έλκος (<i>Leptosphaeria maculans</i> - LEPTMA) Μυκοσφαιρέλλα (<i>Mycosphaerella brassicicola</i> - MYCOBR)	50	50 – 100	50	ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη ανάπτυξης των κεφαλών έως ότου το 70% των κεφαλών να έχουν κλείσει BBCH 40-47	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): - Τριαντάφυλλα (ROSSS) - Χρυσάνθεμα (CHYHO) - Γαρύφαλλα	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP) Κερκοσπορίωση (<i>Cercospora</i> sp. - CERCSP) Ανθράκωση (<i>Colletotrichum</i> sp. - COLLSP) Ωίδιο (<i>Erysiphe</i> sp. - ERYSSP)	50	50 – 100	50	ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη ανάπτυξης της βλάστησης έως την ωρίμανση των σπόρων/καρπών BBCH 40-89	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες

(DINCA) - Γλαδιόλα (GLASS) - Καλεντούλα (CLDOF) - Ντάλια (DAHSS) - Βερόνικα (VEROF) - Μπιγκόνια (CMIGR) - Ποτεντίλη (PTLER) - Αγγελική (ANKAR) - Ευώνυμο (EUOEU) - Αλθαία (ALGOF)	Σκωρίαση (<i>Phragmidium</i> sp. - PHRASP) <i>Uromyces</i> sp. - UROMSP) <i>Puccinia</i> sp. - PUCSCSP) <i>Phyllosticta</i> sp. - PHYSSSP) Ραμουλάρια <i>Ramularia</i> sp. - RAMUSP) Σεπτόρια (<i>Septoria</i> sp. - SEPTSP) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium</i> sp. - STEMSP)					
<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Φύλλα σέλινου** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (APUGS) Φύλλα άνηθου** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) (AFEGR)	Σεπτόρια (<i>Septoria</i> sp. - SEPTSP) Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i> - ERYSHE) <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP)	50	50 – 100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)	<u>Υπαίθρου:</u> 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες <u>Θερμοκηπίου:</u> 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες

Παρατηρήσεις:

- Εφαρμόζετε την χαμηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι χαμηλή και την υψηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).
- Στα καλλωπιστικά, συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή πριν την καθολική εφαρμογή του σκευάσματος
* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπώριο και την κερκόσπορα της ελιάς και στη φώμοψη της ροδακινιάς. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».
** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα φύλλα σέλινου, στα φύλλα άνηθου, την καστανιά, την αμυγδαλιά, τη φιστικιά και την καρυδιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Αγκινάρα, Μπρόκολο (Υ), Κουνουπίδι (Υ), Μαϊντανός(Υ&Θ), Σέλερυ (Υ&Θ), Κρεμμύδι (Υ), Σκόρδο (Υ), Φύλλα σέλινου (Υ&Θ), Φύλλα άνηθου (Υ&Θ)	14 ημέρες
Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Σμέουρα, Βατόμουρα, Τομάτα (Υ), Βερικοκιά	7 ημέρες
Αμπέλι, Λάχανο (Κραμπί), Πράσο, Ζαχαρότευτλο, Παντζάρι (γογγυλόριζα), Λαχανάκια Βρυξελλών	21 ημέρες
Ελιά	30 ημέρες
Φράουλα (Υ&Θ), Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Υ&Θ), Κολοκύθι (Υ&Θ), Πεπόνι (Υ&Θ), Καρπούζι (Υ&Θ), Πατάτα, Γλυκοπατάτα, Μελιτζάνα (Υ&Θ), Πιπεριά (Υ&Θ)	3 ημέρες
Όσπρια, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά	28 ημέρες
Σπαράγγι, Καλλωπιστικά	----

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

-Το SCORE 25EC περιέχει το δραστικό συστατικό difenoconazole. Το Difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMs) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεσης εργοστερόλης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DIMs.
- Να μην γίνονται πάνω από το 50% των συνολικών εφαρμογών με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στις τριαζόλες.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μέχρι ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS07



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- | | |
|-------------|---|
| H304 | Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. |
| H319 | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό |
| H351 | Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου |
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- | | |
|---|---|
| P102 | Μακριά από παιδιά. |
| P201 | Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. |
| P202 | Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. |
| P270 | Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| P280 | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. |
| P405 | Φυλάσσεται κλειδωμένο. |
| «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος». | |
| «Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών». | |
| P501 | Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. |
| EUH 066 | Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. |
| SP1 | Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. |
| SPe3 | Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια ασέκαστη ζώνη: <ul style="list-style-type: none">- 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς.- 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού- 15 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών (όψιμες εφαρμογές)- 25 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών (πρώιμες εφαρμογές), της κερασιάς και της δαμασκηιάς- 30 μέτρων για τις καλλιέργειες της βερικοκιάς και της ροδακινιάς.- 12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες των ζαχαροτεύτλων, του παντζαριού, των ξερών φασολιών, της φακής, των ρεβιθιών και των λούπινων.- 10-12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τις |

καλλιέργειες της μελιτζάνας, της πιπεριάς, του αγγουριού, του κολοκυθιού, του πεπονιού, του καρπουζιού, της τομάτας, της φράουλας, της πατάτας, της γλυκοπατάτας, του κρεμμυδιού, του σκόρδου, του πράσου, του μαϊντανού, της αγκινάρας, του λάχανου, του κουνουπιδιού, του μπρόκολου, των λαχανάκιων Βρυξελλών, του σέλερου, των φύλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου και του σπαραγγιού

- 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της καστανιάς, της αμυγδαλιάς, της φιστικιάς και της καρυδιάς.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τα σμέουρα και τα βατόμουρα.

EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Μην προκαλείτε εμετό

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:


Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 29/05/2026.....




Κωνσταντής Σπανάσης
για Διευθυντή
Τμήματος Γεωργίας