



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση 1132 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 29/04/2026, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τον Κάτοχο της άδειας,
- την αίτηση με αρ. 5339 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 12/05/2026, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PROMANAL AGRO ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2912

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

29/05/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/11/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Ο.Τ. 20, Κ35-55,
Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Promanal Agro

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Paraffin oil (CAS 8042-47-5): 83% β/ο ή 97,6% β/β
βοηθητικές ουσίες: 2,4% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανία
2. NITROFARM A.E.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανία
2. NITROFARM A.E.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100κ.εκ. έως 1Λ	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2.	Δοχεία	2Λ έως 25Λ	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3.	Βαρέλια	200Λ	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
4.	IBC Container	820Λ	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: paraffin oil (CAS 8042-47-5)

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 100% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. W. NEUDORFF GmbH KG, Γερμανία
2. Petrochimica Valenciana S.L., Ισπανία

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

1. Hansen & Rosenthal KG, Γερμανία
2. Petro-Canada Lubricants Inc., Καναδάς
3. Aceites Especiales del Mediterraneo, S.A.
(AEMEDSA), Ισπανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκευσ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές Λεμονιές Μανταρινιές Κλημεντίνες)	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>) Παρλατόρια (<i>Parlatoria pergandei</i>) και άλλες ψώρες	1000 – 1500	100 – 220	1000 – 2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1 – 2 / >60
	Αλευρώδεις (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrixus floccosus</i>)		50 – 220	500 – 2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή	
Μηλοειδή (Μηλιά Αχλαδιά)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) και άλλες ψώρες	750 – 1000	80 – 100	600 – 1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1
	Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)		125 – 150	940 – 1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση	
Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηλιά)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) και άλλες ψώρες	750 – 1000	80 – 100	600 – 1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1
	Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)		125	940 – 1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση	
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας*</u> : Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i> – PARLOL) Λεκάριο (<i>Saissetia oleae</i> – SAISOL)	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων ως το στάδιο των μικρών καρπών BBCH 68-71	1

	Πολλίνια (<i>Pollinia pollini</i> – POLNPO) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> – ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i> – LEPSUL) Ψώρες (<i>Leucaspis riccae</i> – LEUARI, <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> - CHRYDI) Ακάρεα (<i>Eriophyes vitis</i> – ERPHVI, <i>Tegolophus hassani</i> – TEGLSP, <i>Oxycenus maxwelli</i> – OXYNMA, <i>Eotetranychus carpini</i> – EOTECA)						
Χρήση Ησσονος σημασίας: Ακτινιδιά* ATIDE	(<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> – QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE) Μετκάλφα (<i>Metcalfa pruinosa</i> – METFPR) Βαμβακάδα (<i>Euphyllura</i> sp. – EUPHSP) Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> – METTUL)	750-1000	80-150	600-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή. BBCH <60 BBCH >85	2	
Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Αμυγδαλιά* PRNDU Καρυδιά* IUGRE Φιστικιά* PIAVE	Κοκκοειδή Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE, <i>Planococcus / Pseudococcus</i> sp. – PSECSP) Μυτιλόμορφη ψώρα				Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά τη συγκομιδή. (BBCH 57-69 και BBCH 99)	2	

	(<i>Lepidosaphes ulmi</i> – LEPSUL) Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> – AONDAU) κ.α. ψώρες (<i>Sphaerolecanium prunastri</i> – LECAPN, <i>Eulecanium persicae</i> – LECAPN, <i>Melanaspis inopinata</i> – MELAIN) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR)					
Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Στα Εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/δεκάριο. 3. Κατά τη χρήση του PROMANAL AGRO τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός. 5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 °C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας * «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιάς, ακτινιδιάς, αμυγδαλιάς, καρυδιάς και φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Ακτινιδιά, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες)

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Sp1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
- Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- **10 μέτρων** σε Εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.
- **20 μέτρων** σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, ακτινιδιά, αμυγδαλιά, καρυδιά και φιστικιά.
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

- P301+P310:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- P331:** ΜΗΝ προκαλέστε εμετό
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.**
- Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:


Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν ή σκισθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντλησης αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα.
2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 29/05/2026




Κωνσταντής Σπανάσις
για Διευθυντή
Τμήματος Γεωργίας