



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 5162 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 08/10/2025, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CELEST 025FS... ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3168

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

12/06/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/09/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λεωφόρος Ανθούσας,
Ανθούσα Αττικής 15349, Ελλάδα

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Celest 025FS

2. Μορφή: Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

fludioxonil: 2,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 97,5% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Switzerland

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Syngenta Production France SAS, Saint-Pierre, Γαλλία

2. Syngenta Espana, S.A., Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

2. Syngenta Espana, S.A., Ισπανία

3. Syngenta Production France SAS, Saint-Pierre, Γαλλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1Λ	PE/PA, High Density Polyethylene (HDPE) και fluorinated high-density polyethylene (f-PE)
2	Βαρέλι / Δοχείο	5Λ, 10Λ, 12Λ, 20Λ, 50Λ, 60Λ και 200Λ	High Density Polyethylene (HDPE)
3	Βαρέλι RIBC	1000Λ	HDPE με γαλβανισμένο ατσάλινο σκελετό (liner and galvanised steel frame)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: fludioxonil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG Switzerland

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Syngenta Crop Protection AG, Monthey, Ελβετία
2. Fine Organics Limited

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση σπόρων, που περιέχει fludioxonil
Το fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολών) προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Το CELEST 025FS, εφαρμόζεται σαν υδατικής βάσης πολτός (slurry) χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα εφαρμογής και τα οποία εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κάλυψη των σπόρων. Ανομοιόμορφη ή μη πλήρης κάλυψη είναι πιθανόν να μην δώσει τον αναμενόμενο έλεγχο των καταπολεμούμενων ασθενειών.

Να γίνεται πολύ προσεκτική ανάμειξη της προτεινόμενης, κάθε φορά, ποσότητας του CELEST 025FS, με το απαιτούμενο νερό.

Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος επένδυσης των σπόρων.

Το CELEST 025FS εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό με την μέθοδο της υγρής εφαρμογής χρησιμοποιώντας όγκο νερού 500 – 1000 κυβ. εκ. ανά 100 κιλά σπόρου.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. /100 Kg σπόρου	Όγκος νερού / 100 Kg σπόρου (για τη μέθοδο slurry)		
Σιτάρι	Φουζάριο (<i>Microdochium nivale</i> , <i>Fusarium</i> sp.)	200	500 – 1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
	Σεπτορίαση (<i>Septoria nodorum</i>)				
	Δαυλίτες (<i>Tilletia caries</i>)				
Κριθάρι	Φουζάριο (<i>Fusarium</i> sp.)	200	500 – 1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
	Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium gramineum</i>)				
Σίκαλη	Φουζάριο (<i>Microdochium nivale</i> <i>Fusarium</i> sp.)	200	500 – 1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
	Φουζάριο (<i>Microdochium nivale</i> <i>Fusarium</i> sp.)	200	500 – 1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
Τριτκάλε	Φουζάριο (<i>Microdochium nivale</i> <i>Fusarium</i> sp.)	200	500 – 1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
Ηλίανθος	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	600 (ισοδύναμο με 45 ml/150.000 σπόροι)	500 – 1000	Επένδυση σπόρων	Μία εφαρμογή
Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε, Ηλίανθος	Μη εφαρμόσιμο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **fludioxonil - 12**

Οι επενδεδυμένοι σπόροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή.

Οι συσκευασίες των επενδυμένων σπόρων (σακιά), δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Περιέχει 1,2 –benzothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν)

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 12/06/2026



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας