



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 5252 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 16/02/2026, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **REMEDIER**.....ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3708

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

15/04/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/11/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road,
Spencers Wood, reading, RG7 1NT, Ηνωμένο Βασίλειο

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Remedier

2. Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

1. *Trichoderma asperellum* στέλεχος ICC012: 2% β/β

2. *Trichoderma gamsii* στέλεχος ICC080 : 2% β/β

Ελάχιστη ολική συγκέντρωση σε CFU* : 3×10^7 /γρ.

*UFC (Colony Formated Units)=Μονάδες σχηματισμένων αποικιών

Βοηθητικές ουσίες : 96 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

ISAGRO S.p.A, Italy

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

ISAGRO S.p.A, Italy

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

ISAGRO S.p.A, Italy

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	250 γρ., 500γρ., 1 κιλό, 2.5 κιλά και 5 κιλά	Τριπλό σύμμικτο υλικό πολυεστέρα εξωτερικά, αλουμινίου και πολυαιθυλενίου εσωτερικά PET/AL/PE
2.	Κουτί με εσωτερική σακούλα	250 γρ., 500γρ.,1 κιλό, 2.5 κιλά και 5 κιλά	Σακούλα: Τριπλό σύμμικτο υλικό πολυεστέρα εξωτερικά, αλουμινίου και πολυαιθυλενίου εσωτερικά PET/AL/PE Κουτί: Χάρτινο

Γ) i. Δραστική ουσία 1

1. Κοινή Ονομασία: *Trichoderma asperellum* στέλεχος ICC012

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 5×10^9 CFU/γρ

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: ISAGRO S.p.A, Italy

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: ISAGRO S.p.A, Italy

ii. Δραστική ουσία 2

1. Κοινή Ονομασία: *Trichoderma gamsii* στέλεχος ICC080

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 5×10^9 CFU/γρ

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: ISAGRO S.p.A, Italy

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: ISAGRO S.p.A, Italy

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το REMEDIER είναι βιολογικό μυκητοκτόνο, με βάση φυσικά και επιλεγμένα στελέχη των μυκήτων *Trichoderma asperellum* και *Trichoderma gamsii*, που δρουν ανταγωνιστικά στους εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες.

Συνιστάται για πρόληψη σοβαρών μυκητολογικών ασθενειών (π.χ. τήξεις σπορείων, αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες), που προκαλούνται από φυτοπαθογόνους μύκητες που παρασιτούν στις ρίζες και στο λαιμό των προστατευομένων καλλιεργειών (όπως: *Rhizoctonia solani*, *Pythium spp.*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotinia sp.*, *Verticillium dahlia*, *Thielaviopsis basicola*, *Sclerotium rolfsii*, *Phytophthora capsici*, *Phytophthora sp.*, *Armillaria mellea* κ.α).

Μετά την εφαρμογή του REMEDIER οι ανταγωνιστικοί μύκητες αποικίζουν στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα των φυτών ανταγωνιζόμενοι τα φυτοπαθογόνα σε θρεπτικά στοιχεία και χώρο. Επίσης προσβάλλουν τα κυτταρικά τοιχώματα των φυτοπαθογόνων με λυτικά ένζυμα και ανασταλτικές ενώσεις.

Συνεπώς η εφαρμογή του REMEDIER συνιστάται πριν τον αποικισμό των φυτοπαθογόνων στη ριζόσφαιρα των φυτών.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ανάλογα με την εποχή εφαρμογής και την καλλιέργεια το REMEDIER εφαρμόζεται με ψεκασμό εδάφους καθολικό ή κατευθυνόμενο στη γραμμή σποράς ή φύτευσης και σε ορισμένες περιπτώσεις ανάπτυξης φυταρίων σε φυτώρια και σπορεία με απευθείας εφαρμογή στο υπόστρωμα ανάπτυξης.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Για να ευνοηθεί η βλάστηση των κονιδίων, η ανάπτυξη και αναπαραγωγή των ανταγωνιστικών μυκήτων και ο συντομότερος αποικισμός του ριζικού συστήματος **συνιστάται 24-36 ώρες πριν την εφαρμογή** προ-αραίωση του σκευάσματος και **παρασκευή υδατικού εναιωρήματος** με ανάμιξη **500 γρ. REMEDIER ανά 5 λίτρα νερού**, αναδεύοντας κατά διαστήματα.

Στη συνέχεια (μετά τις 24-36 ώρες) **συνιστάται διάλυση του εναιωρήματος** στην απαιτούμενη ποσότητα νερού (**80-100 λίτρα/δεκ.**) για ορθή εφαρμογή του σκευάσματος.

Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής: Ο εξοπλισμός εφαρμογής να πλένεται με νερό και σαπουνί.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής
Οπωροφόρα δένδρα Μηλοειδή (Αχλαδιά, Μηλιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηινιά), Ακτινιδιά , Μικροί καρποί (Σμέουρα, Βατόμουρα κ.α), Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες), Ελιά, Εσπεριδοειδή , Καλλωπιστικά και δασικά δένδρα και θάμνοι (Σπάρτο, Τριανταφυλλιά, Σφένδαμος)	Σηψιρριζία <i>(Armillaria mellea)</i>	250 γρ. /δεκ. .	<u>Πριν και κατά τη μεταφύτευση</u> α) 5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση με κατευθυνόμενη εφαρμογή στις γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος φύτευσης . β) Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη μεταφύτευση <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες</u> α) αρχή της άνοιξης πριν /κατά την έναρξη της νέας βλάστησης β) αρχή φθινοπώρου πριν από την έναρξη λήθαργου, με κατευθυνόμενη εφαρμογή στις γραμμές φύτευσης .
Αμπέλι	Ίσκα <i>(Fomes Phellinus igniarius & Stereum hirsutum)</i>	250 γρ. σε 100 λίτρα νερό με ελάχιστο όγκο νερού 40 λίτρα/δεκ.	Μετά το χειμωνιάτικο /ανοιξιάτικο κλάδεμα εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό στα κλαδιά με εκτεθειμένες πληγές , και πάντως πριν το φούσκωμα των οφθαλμών. Σε συνθήκες πίεσης προσβολής συνιστάται δεύτερος ψεκασμός με την ίδια δόση κατά την περίοδο της έκπτυξης των οφθαλμών.
Καλλωπιστικά φυτά χρυσάνθεμο, κυκλάμινο, αλεξανδρινό (ποΐνσέττια), πρίμουλα κ.λπ. (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Σήψεις ριζών <i>Phytophthora sp., Pythium sp., Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sp., Rhizoctonia solani</i>	250γρ/μ ³ υποστρώματος	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ανάμιξη απευθείας του σκευάσματος (χωρίς προδιάλυση) με το υπόστρωμα ανάπτυξης ή διάλυση του στην απαιτούμενη ποσότητα νερού για πλήρη διαβροχή του υποστρώματος μερικές ημέρες πριν τη σπορά ή μεταφύτευση . Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.
		250γρ/μ ³	<u>Σε Θερμοκήπιο ή στην Υπαίθρο:</u> Ομοιόμορφη εφαρμογή στην επιφάνεια του εδάφους 5-7 ημέρες πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση. Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση .
		α)10γρ./ λίτρο νερού	<u>Σε νεαρά φυτάρια σπορείων</u> Πριν τη μεταφύτευση α) εμβάπτιση των δίσκων που φέρουν τα γλαστράκια για λίγα λεπτά σε διάλυμα 10 γρ. σκευάσματος ανά λίτρο νερό. β) ομοιόμορφη εφαρμογή στην επιφάνεια του εδάφους 5-7

		β) 250γρ. /δεκ.	ημέρες πριν τη μεταφύτευση .
Οπωροκηπευτικά Καρότο, μαρούλι, καλαμπόκι γλυκό, σαλάτα, αντίδι, ρόκα, μάραθος, βασιλικός, φασόλι, αγκινάρα, κολοκυθάκι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i>	250γρ./m ³ υποστρώματος	<u>Σε φυτώρια και σπορεία:</u> Ανάμιξη με το υπόστρωμα ανάπτυξης πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση . Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση. <u>Σε Θερμοκήπια ή Υπαίθρο:</u> Ομοιόμορφη εφαρμογή στην επιφάνεια του εδάφους 5-7 ημέρες πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση. Επανάληψη της εφαρμογής κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.
	<i>Phytophthora spp</i>		
Φράουλα, μάραθος, τομάτα, πεπόνι, σέλινο, κολοκυθάκι, αγγούρι	<i>Rhizoctonia solani</i>	250γρ./δεκ.	
Σπανάκι, καρότο, μαρούλι, καλαμπόκι γλυκό, σαλάτα, αντίδι, ρόκα, μάραθος, βασιλικός, φασόλι, αμπελοφάσουλο, κολοκυθάκι, αγκινάρα	<i>Phytophthora capsici</i>		
Πιπεριά	Τήξεις σπορείων <i>Damping off</i> , <i>Pythium sp.</i> , <i>Thielaviopsis basicola</i>		
Φυτώρια (ντομάτα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, σέλινο, αρωματικά φυτά, λάχανο, μελιτζάνες)	Αδρομύκωση <i>Verticillium dahliae</i>		
Πιπεριά, μελιτζάνα, ντομάτα, σέλινο			
Παρατηρήσεις: 1. Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 2. Συνιστώμενος όγκος νερού: 80-100 λίτρα νερού ανά δεκάριο 3. Το REMEDIER έχει μόνο προληπτική δράση. Σε περίπτωση ενεργής προσβολής δεν δρα θεραπευτικά. 4. Αποφύγετε την άρδευση μετά την εφαρμογή για αποτροπή τη μεταφοράς σπορίων στα υπόγεια ύδατα. 5. Μπορεί να εφαρμοστεί και με σύστημα υδρόλίπανσης σε ανάμιξη με κοινά λιπάσματα			

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
3 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες του σημείου 5	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Εφαρμόζεται με ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους 10°C.

Σε ξηρά εδάφη συνιστάται πριν την εφαρμογή ελαφρά άρδευση.

Απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία 1%. Σε εδάφη πτωχά σε οργανική ουσία (<1%) συνιστάται ανάμιξη με υγρό λίπασμα, πλούσιο σε οργανική ουσία.

Να εφαρμόζεται όταν δεν φυσάει.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Περιέχει *Trichoderma asperellum* και *Trichoderma gamsii*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102 + P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα, ή με τα ρούχα.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P420 Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Χρησιμοποιήστε γάντια και προστατευτική ενδυμασία.

ΕΥΗ 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Μην καταψύχετε το σκεύασμα. Αποθηκευμένο μακριά από άλλα υλικά, την αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία κάτω από 25°C, χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 15 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής του


ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 12/06/2026


Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας
Σφραγίδα
