



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 1095 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 06/02/2026, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τις συσκευασίες (υλικό), τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος (μη σημαντική αλλαγή),

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **REVUS 250 SC**...ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3840

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

29/05/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/12/2026

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λεωφόρος Ανθούσας Αττικής, Τ.Κ. 15349, Ελλάδα

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Revus 250 SC

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Mandipropamid: 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 74,9% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετίας

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

- 1) Syngenta Production France S.A.S., Aigues-Vives, Γαλλία
- 2) Syngenta Limited, Grangemouth, Ηνωμένο Βασίλειο
- 3) Syngenta South Africa (Pty) Limited, Νότια Αφρική
- 4) Syngenta Espana, S.A., Ισπανία
- 5) Phyteurop SA, Γαλλία
- 6) Syngenta Production France S.A.S., Saint-Pierre, Γαλλία
- 7) Chemark ZRT, Ουγγαρία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

- 1) Syngenta Production France S.A.S., Γαλλία
- 2) Syngenta Limited, Grangemouth, Ηνωμένο Βασίλειο
- 3) Syngenta South Africa (Pty) Limited, Νότια Αφρική
- 4) Syngenta Espana, S.A., Ισπανία
- 5) Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Ελλάδα
- 6) Phyteurop SA, Γαλλία
- 7) Syngenta Production France S.A.S., Saint-Pierre, Γαλλία
- 8) Chemark ZRT, Ουγγαρία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη/Μπιτόνι	100 κ.εκ. έως και 20 λίτρα	HDPE ή COEX PE/PA ή PET ή HDPE/EVOH ή HDPE/PA

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

mandipropamid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

93%(β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG, Monthey, Ελβετία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου. Η δραστική ουσία mandipropamid έχει διελασματική δράση, παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Εμφανίζει κυρίως προληπτική δράση αλλά και θεραπευτική κατά τη διάρκεια της επώασης της ασθένειας.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο αμέσως μετά τον ψεκασμό. Πλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη		
Πατάτα SOLTU	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN)	20 – 100	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από το στάδιο όπου το 10 % των φυτών έχουν κλείσει τις γραμμές έως την έναρξη κιτρινίσματος των φύλλων. (BBCH 31-91)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Τομάτα (Υ) LYPES Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN)	30-150	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πλάγιου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 21-89)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN)	60-120	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 11-89)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Σπανάκι (Υ) SPQOL Σέσκουλοι/ Φύλλα τεύτλων (Υ) BEAVF	Περωνόσπορος (<i>Peronospora effuse</i> - PEROFS)	20-60	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου του 5ου φύλλου έως 50% του όγκου που είναι τυπικό για την ποικιλία (BBCH 14-45)	Μέχρι 2 εφαρμογές κάθε 7 ημέρες
Αγκινάρα (Υ) CYUSC	Περωνόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLA)	30-100	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής). (BBCH 15-55)	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Μπρόκολο (Υ) BR5OK Κουνουπίδι (Υ) BR5OB	Περωνόσπορος (<i>Peronospora brassicae</i> - HPERBR)	20-80	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 6ου πραγματικού φύλλου έως 80% η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. (BBCH 16-49)	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες
Αμπέλι VITVI	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	30-100	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης (έναρξη χρωματισμού των ραγών με το τυπικό για την ποικιλία χρώμα). (BBCH 09-81)	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες
Ραπανάκι (Υ) RAPSR	Περωνόσπορος (<i>Peronospora</i>)	20-60	60	Ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 2ου	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7

	<i>brassicae</i> - HIPERBR)			πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. (BBCH 12-49)	ημέρες
Πεπόνι (Y+Θ) CUMME Καρπούζι (Y+Θ) CITLA Κολοκύθι (Y+Θ) CUUPG Κολοκύθα (Y+Θ) CUUPM	Περωνόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - PSPECU)	60 – 120	60	ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 11-89)	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Μαρούλια & σαλατικά (Y&Θ): - Μαρούλι (LACSA) - Ρόκα (ERUVE) - Λυκοτρίβολο (VLLLO) - Σκαρόλα (CICEN) - Ραδίκι (CICIN) - Αντίδι (CICEN) - Σταμναγκάθι (CICSP) - Κάρδαμο (LEPSA) - Γαιοκάρδαμο (BARVE) - Κόκκινο σινάπι(BRSJU) - Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)	Περωνόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLA)	<u>Υπαίθρου</u> 20 – 100 <u>Θερμοκηπίου</u> 20 – 60	60	ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. (BBCH 11-49)	<u>Υπαίθρου:</u> Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες <u>Θερμοκηπίου:</u> 1 εφαρμογή
Βότανα και βρώσιμα άνθη (Y&Θ): - Φραγκομαϊντανός (ANRCE) - Σχοινόπρασο (ALLSC) - Φύλλα σέλινου (APUGS) - Μαϊντανός (PARCR) - Φασκόμηλο (SALOF) - Δενδρολίβανο (RMSOF) - Θυμάρι (THYVU) - Βασιλικός (OCIBA) - Δάφνη/ Δαφνόφυλλα (LURNO) - Δρακόντιο/ Εστραγκόν (ARTDR)	Περωνόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLA)			ψεκασμός φυλλώματος όταν οι συνθήκες ευνοούν τις προσβολές. Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως ότου η φυλλική μάζα να φτάσει το τυπικό της μέγεθος και μορφή. (BBCH 11-49)	<u>Υπαίθρου:</u> Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες <u>Θερμοκηπίου:</u> 1 εφαρμογή

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ)	3 ημέρες
Σπανάκι (Υ), Σέσκουλα/Φύλλα τεύτλων (Υ) Ραπανάκι (Υ), Αγκινάρα (Υ) <u>Μαρούλια και σαλατικά (Υ+Θ):</u> Μαρούλι, Ρόκα, Σκάρολα, Ραδίκι, Αντίδι, Σταμναγκάθι, Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Κόκκινο σινάπι, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης). <u>Βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ+Θ):</u> Φραγκομαϊντανός, Σχοινόπρασο, Φύλλα σέλινου, Μαϊντανός, Φασκόμηλο, Δενδρολίβανο, Θυμάρι, Βασιλικός, Δάφνη/Δαφνόφυλλα, Δρακόντιο/ Εστραγκόν.	7 ημέρες
Μπρόκολο (Υ), Κουνουπίδι (Υ)	14 ημέρες
Αμπέλι, Πατάτα	21 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 40

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Σε πρόγραμμα ψεκασμών θα πρέπει ο συνολικός αριθμός ψεκασμών με το **REVUS 250 SC** ή με **CAA μυκητοκτόνα**, να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού ψεκασμών.
- Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας να εφαρμόζεται προληπτικά.

Σε ραπανάκι, οι εφαρμογές με REVUS 250 SC να μην ξεπερνούν τις 6 ανά έτος συνολικά για όλες τις καλλιεργητικές περιόδους.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH 208 Περιέχει 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

EUH401 Για να αποφύγετε τους κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και παπούτσια σε περίπτωση επαφής με την καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό».

P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SP3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **3 μέτρων** για το αμπέλι

- **1 μέτρου** για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας και την περιοχή κάτω από τα βλέφαρα με πολύ νερό για 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους. Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει κανονικά ή καθόλου, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά ερμητικά κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 29/05/2026




Κωνσταντής Σπανάσης
για Διευθυντή
Τμήματος Γεωργίας