



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τη διεύρυνση της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς, ημερομηνίας 23/04/2026, σε χρήσεις ήσσονος σημασίας (*Bactrocera zonata* και *Bactrocera dorsalis*),

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ARMAGEDDON 20SL**...ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3983-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

19/06/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

28/02/2034

2. Κάτοχος της άδειας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Armageddon 20SL

2. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Acetamiprid: 20% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 82,2 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm Europe GmbH

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη ,δοχείο	250 κ.εκ., 1 λίτρο, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα	Πλαστικό HDPE (mono-layer)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Acetamiprid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

99% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Jiangsu Yangnong Chemical Group Co., Ltd.
2. Ningbo Sunjoy Agrosience Co., Ltd

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο - τρεις (2 - 3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά CIDSΙ - Λεμονιά CIDLI - Μανταρινιά CIDNO - Γκρέιπ φρούτ CIDPA - Φράπα CIDGR - Λάιμ CIDAF	Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i> , PHYNCI)	35 – 50	100 – 140	50 – 70	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες
	Πράσινη αφίδα (<i>Aphis spiraecola</i> , APHISI) Αφίδα βαμβακιού (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO) Μαύρη αφίδα (<i>Toxoptera aurantia</i> , TOXOAU)					
	Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	25	60 – 140	35		
	Κόκκινη ψύρα (<i>Aonidiella aurantia</i> , AONDAU) Παρλατόρια (<i>Parlatoria pergandii</i> , PARLPE) Ψευδοκοκκος (<i>Planococcus citri</i> , PSECCI)	50 – 70	100 – 200	150		

Μηλοειδή: - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά PYUCO	Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter</i> <i>blancardella</i> , LITHBL, <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> , PRYCCO, <i>Leucoptera malifoliella</i> , LEUCSC)	25 – 35*	70-100*	25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες
	Πράσινη αφίδα (<i>Aphis pomi</i> , APHIPO)	15 – 25	100	25		
	Ρόδινη αφίδα (<i>Dysaphis plantaginea</i> , DYSAPL) <i>Αφίδα αχλαδιού</i> (<i>Dysaphis pyri</i> , DYSAPY)	25	100	25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες
	Καρπόκαπα (<i>Cydia pomonella</i> , CARPPO) Οπλοκάμπη (<i>Homocampa</i> sp., HOPLSP)	35 – 50*	50-70*	25	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
Ροδακινιά Νεκταρινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE) Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera malifoliella</i> , LEUCSC, <i>Phyllonorycter blancardella</i> , LITHBL) Τζιτζικακία (<i>Empoasca</i> sp., EMPOSP)	25 – 35*	55-80*	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αφίδες (<i>Hyalopterus pruni</i> , HYALPR, <i>Brachycaudus</i> sp., ANURSI)	25	80	20		

	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i> , LASPMO) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i> , ANARLI)	35 – 50*	40-55*	20	ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες
	Θρίπες (<i>Thrips meridionalis</i> , THRIME)	35 – 50*	40-55*	20	ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
Δαμασκηλιά PRNDO	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Hyalopterus pruni</i> , HYALPR) Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera malifoliella</i> , LEUCSC, <i>Phyllonorycter blancardella</i> , LITHBL)	25	100	25	ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες
	Καρπόκαψα (<i>Cydia funebrana</i> , LSPFU)				ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	
Κερασιά PRNAV	Ραγολέτις (<i>Rhagoletis cerasi</i> , RHAGCE)					2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
	Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	25 – 35	100 – 150	35	ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
	Μαύρη αφίδα (<i>Myzus cerasi</i> , MYZUCE)	15 – 25	100 – 150	25		

Ελιά Ελαιοποιήσιμη OLVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> , PRAYOL)	50	50 – 100	50	Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπώβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες
	Δάκος της ελιάς (<i>Bactrocera oleae</i> , DACUOL) Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	25 – 50	50 – 100	50	Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	
Ελιά Επιτραπέζια OLVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> , PRAYOL)	45	50-100	45	Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας ή καρπώβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων	1
	Δάκος της ελιάς (<i>Bactrocera oleae</i> , DACUOL) Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO				Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	

	Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο) VITVI	Τζιτζικάρια (<i>Scaphoideus titanus</i> , SCAPLI, <i>Eupoasca vitis</i> , EMPOFL)	25 – 35*	70-100*	25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> , POLYBO)	35 – 45*	55-70*	25	Ψεκασμός κάλυψης σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις	
Βαμβάκι GOSS	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , APHIGO)				Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες
	Χρήση ήσσονος σημασίας: Καφέ Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i> ** HALYHA)	---	50 – 80	20		
Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): - Κάρδαμο (LEPSA) - Γαιοκάρδαμο (BARVE) - Ρόκα (ERUVE) - Κόκκινο σινάπι (BRSJU)	Αφίδες (<i>Nasonovia ribis-nigri</i> , NASORN)		50 – 100	25 – 35	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	(<i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU) (<i>Myzus persicae</i> MYZUPE)	--	50 – 100	20 – 25		
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> , LPTNDE)		40	10 – 15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU)	--	30 – 60	20		
Τομάτα (Υπαίθρου) LYPES	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU)	20 – 25*	50 – 100*	20 – 25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> , BEMITA)	35 – 50*	60-85*	30	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Τομάτα (Θερμοκηπίου) LYPES	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU)	20-25*	50-100*	20-25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> , BEMITA)	35-50*	50-70*	25		
Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) SOLME	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU)	20-25	50-100	20-25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> , BEMITA)					
	Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	35-50	100-170	35-50		
Κουνουπίδι (Υπαίθρου) BR SOB Μπρόκολο (Υπαίθρου) BR SOK Λάχανο (Υπαίθρου) BR SOL	Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i> , PLUTMA)	---	50 – 100	25 – 35	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Ελαιοκράμβη BRSNN	Αφίδες (<i>Brevicoryne brassicae</i> , BRVCBR)	--	10 – 40	25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
	30					
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:					
1. Χρησιμοποιήστε τη μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. 2. Μην ψεκάζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικονίαση. 3. Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ/100 λιτ.ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά δεκάριο. * Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο δεκάριο. ** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού και κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, κερασιάς, ελιάς, μελιτζάνας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ/δεκάριο), Βαμβάκι, Δαμασκηλιά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο	14 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	21 ημέρες
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ): (δόση 150 κ.εκ/δεκάριο)	60 ημέρες
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Φράπα): (δόση 150 κ.εκ/δεκάριο)	30 ημέρες
Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf)	10 ημέρες
Πατάτα, Μελιτζάνα (Υ), Ελιά ελαιοποιήσιμη	7 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	21 ημέρες
Επιτραπέζια ελιά	28 ημέρες
Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά	3 ημέρες
Τομάτα (Υ)	14 ημέρες
Ελαιοκράμβη	20 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης - HRAC: acetamiprid: 4A

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
Να μη γίνει επανείσοδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις

10. Συνδυαστικότητα: ---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΥΗ 401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Για εφαρμογή σε δέντρα και στο αμπέλι:

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή».

Για εφαρμογή σε θερμοκήπιο:

«Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μια:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 m** για εφαρμογή σε ντομάτα, μελιτζάνα, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf).
- φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 m** για εφαρμογή σε πατάτα, αμπέλι και ελαιοκράμβη.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης **15 m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%**, σε δαμασκηλιά.
- απέκαστη ζώνη **30 m** ή απέκαστη ζώνη **20 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε

κερασιά.

- φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 m**, ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή.
- αφέκαστη ζώνη **50 m** με φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε εσπεριδοειδή (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση).
- φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε ελιά.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργημένη γη:

- **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή νωρίς), βερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά.
- **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%** ή **5 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή αργά) και κερασιά.
- **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο), δαμασκηλιά, μηλιά και αχλαδιά.
- **5 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** σε ντομάτα και μελιτζάνα.
- **15 m** ή **10 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5 m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε ελιά.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P301+P330+P312: Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα και σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Armageddon 20SL που είναι αδειοδοτημένο στην Ισπανία με εμπορικό όνομα Carnadine και αριθμό έγκρισης ES-00629, και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Nufarm.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Carnadine με αριθμό άδειας 3764.

- Η εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Carnadine που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος). Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.
- Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Armageddon 20SL που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.
- Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ισπανία για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντλησης αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα.
2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 19/06/2026



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας