

ARMAGEDDON 20SL

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και σπράκκου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μπεχτικών εντόμων καθώς και ραπτικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες.
Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικωτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ARMAGEDDON 20SL

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Acetamiprid: 20 % β/α
Βοηθητικές ουσίες: 82,2 % β/β
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΔΕΛΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡ. ΔΕΛΤΑ : 3983-Ρ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος ανά ανά με ανθεκτική σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανδούση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτί. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίκνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτί και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο - τρεις (2 - 3) φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΙΔΕΙΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΑΙΜ, ΦΡΑΠΑ) για **Φυλλοκνίστα** με δόση 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-70 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες. Για **Πράσινη αφίδα, Αφίδα βαμβακιού, Μαύρη αφίδα, Χρήσιμες ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών****, **Μύγα των ροδάκινων**** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 60-140 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες. Για **Κόκκινη ψώρα, Παρλιτόρρα, Ψευδοκόκκο** με δόση 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες.

ΜΗΛΟΙΔΕΙΣ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ) για **Φυλλορύκτες** με δόση 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 70-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες. Για **Πράσινη αφίδα** με δόση 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες. Για **Ρόδινη αφίδα, Αφίδα ακακιάς** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες. Για **Καρπόκαυμα** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες. Για **Ολοκόκκο** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 60 ημέρες.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ για **Πράσινη αφίδα, Φυλλορύκτες, Τσιτζίκια** με δόση 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 55-80* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**. Για **Καρπόκαυμα, Ανάστρο** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 40-55* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **1 εφαρμογή**. Για **Θρίπες** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 20 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 40-55* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**.

ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ για **Αφίδες, Φυλλορύκτες** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες. Για **Καρπόκαυμα** με δόση 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες.

ΚΕΡΑΣΙΑ για **Ραγολέτες, Χρήσιμες ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών****, **Μύγα των ροδάκινων**** με δόση 25-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 35 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες. Για **Μαύρη αφίδα** με δόση 15-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες.

ΕΛΙΑ **Ελαιολισσοίση** για **Πυρρνοτρίπη** με δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες. Για **Δάκο, Χρήσιμες ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών****, **Μύγα των ροδάκινων**** με δόση 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες.

ΕΛΙΑ **Επιπαρασιότητα** για **Πυρρνοτρίπη** με δόση 45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. **1 εφαρμογή**. Για **Δάκο, Χρήσιμες ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών****, **Μύγα των ροδάκινων**** με δόση 45 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 45 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός καλύψεων σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες. **1 εφαρμογή**.

ΑΜΕΛΙΑ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΣΙΑ) για **Τσιτζίκια** με δόση 25-35* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 70-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**. Για **Ευδερίδα** με δόση 35-45* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 55-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός κάλυψης σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις. **1 εφαρμογή**.

ΒΑΜΒΑΚΙ για **Αφίδες, Καφέ θραυστό (Χρήσιμες ήσσονος σημασίας)**** με μέγιστη δόση 20 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες.

ΛΟΙΠΑ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ BABY LEAF): ΚΑΡΔΑΜΟ, ΓΑΙΟΚΑΡΔΑΜΟ, ΡΟΚΑ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΙΝΑΠΙ για **Αφίδες (Nasonovia ribis-nigri)** με μέγιστη δόση 25-35 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**. Για **Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)** με μέγιστη δόση 20-25 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**.

ΠΑΤΑΤΑ για **Δορυφόρο** με μέγιστη δόση 10-15 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 40 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες. Για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 20 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου) για **Πράσινη αφίδα** με δόση 20-25* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 20-25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**. Για **Αλευρώδεις** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 30 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 60-85* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**.

ΤΟΜΑΤΑ (Θερμοκηπίου) για **Πράσινη αφίδα** με δόση 20-25* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 20-25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**. Για **Αλευρώδεις** με δόση 35-50* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-70* λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) για **Πράσινη αφίδα** με δόση 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 20-25 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες. Για **Αλευρώδεις, Χρήσιμες ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών****, **Μύγα των ροδάκινων**** με δόση 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 35-50 κ.εκ./δ.εκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100-170 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες.

[ΚΟΥΡΝΟΥΠΙΑΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ] (Υπαίθρου) για **Πλουτέλλα** με μέγιστη δόση 25-35 κ.εκ./δ.εκ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δ.εκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **1 εφαρμογή**.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 25 κ.εκ./δεκ. και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/δεκ. και για **Σκαθάρια της γύρης** με μέγιστη δόση 30 κ.εκ./δεκ. και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/δεκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Χρησιμοποιείτε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. 2. Μην ψεκάζετε κατά την άνοση των καλλιεργειών με εντομώφιλη επικονίαση. 3. Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ./100 λίτ. ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά δεκάριο.

* Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο δεκάριο.

** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού και κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, κερασιάς, ελιάς, μελιτζάνας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που σφουρούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ./δεκάριο), Βομβάκι, Δαμασκηνά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Τομάτα (Υ): 14 ημέρες. Μελιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Αμυγλί (ονοποποίηση και επιτραπέζια): 21 ημέρες. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιφ φρουτ) (δόση 150 κ.εκ./δεκάριο): 60 ημέρες. Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Φράπα) (δόση 150 κ.εκ./δεκάριο): 30 ημέρες. Λοσιά σαλατικά (εκτός baby leaf): 10 ημέρες. Πατάτα, Μελιτζάνα (Υ), Ελιά ελαιολαίσιμη: 7 ημέρες. Επιτραπέζια ελιά: 28 ημέρες. Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά: 3 ημέρες. **Ελαιοκράμβη:** 20 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΤΡΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διακρίνεται ανθεκτικότητα: Ομάδα Τρόπου Δράσης - HRAC: acetamiprid: 4A

Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συστατά η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Να μη γίνει επανεισόδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοξότοξ στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:---



ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επίβλαβες σε περίπτωση κατάποσης.

H361d Υποπό για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH 401 Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: K3CF-N9KX-UJAS-WADXX

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένα, μακριά από παιδιά. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό ο προϊόν. **P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. **P202** Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτα/πρόσωπο. **ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΥΓΛΙ:** «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμειξη / φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή.» **ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ:** «Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχο φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.» «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια».

P501 Λάβετε τον περιεχόμενο/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιάστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3 Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφίστοτε από τα επιφανειακά ύδατα μια: • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** για εφαρμογή σε νταμάς, μελιτζάνα, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf). • φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** για εφαρμογή σε πατάτα, αμυγλί και ελαιοκράμβη. • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%**, σε δαμασκινιά. • αφέκαστη ζώνη **30m** ή αφέκαστη ζώνη **20m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε κερασιά. • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m**, ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή. • αφέκαστη ζώνη **50m** με φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε εσπεριδοειδή (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση). • φυτική ζώνη ανάσχεσης **20m** ή φυτική ζώνη ανάσχεσης **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε ελιά.

SPe3 Για να προστατέψετε τα **αερρόβια μ-στόχους** να αφίστοτε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργημένη γη: • **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή νωρίς), βερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά. • **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%** ή **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **90%**, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή αργά) και κερασιά. • **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε αμυγλί (ονοποποίηση και επιτραπέζια), δαμασκινιά, μηλιά και αχλαδιά. • **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** σε νταμάς και μελιτζάνα. • **15m** ή **10m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **50%** ή **5m** με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά **75%**, σε ελιά.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: P301+P330+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας. **P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΑΘΟΝΟΤΕΙΑΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα και σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Συμβουλευτε προσεκτικά τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποκαρwei ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε το εμποτισμένο με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Στην αρχική του απορροβιαστή συσκευασία, καλά κλειστά, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενοπαισθίνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
Λευκωσία, Τηλ. + 357 22 81 53 53
www.premier.com.cy

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Nufarm Europe GmbH

LE/ARMAGEDDON/CY/7