

DIPTRON

Cockroach Gel



Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση κατσαριδών. Για εφαρμογή σε σχισμές και χαραμάδες ή σε άλλα σημεία από επαγγελματίες χρήστες.

Σύνθεση προϊόντος:

Dinotefuran 2.0% β/β

Denatonium benzoate (Πικραντικός παράγοντας) 0.01% β/β

Βοηθητικές ουσίες 97,99% β/β

Τύπος σκευάσματος: RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Εφαρμογή σε σημεία από επαγγελματίες χρήστες

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Τύπος προϊόντος: ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.

Στόχος (συμπεριλαμβανόμενου του σταδίου ανάπτυξης): Γερμανικές κατσαρίδες (*Blattella germanica*), ενήλικα, νύμφες και νεαρά. Ανατολικές κατσαρίδες (*Blatta orientalis*), ενήλικα, νύμφες και νεαρά.

Πεδίο χρήσης: Εσωτερικοί χώροι.

Μέθοδος (οι) εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση κατσαριδών. Για εφαρμογή σε σχισμές και χαραμάδες ή εφαρμογή σε σημεία από επαγγελματίες χρήστες.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής: Τοπική εφαρμογή δολώματος σε μορφή gel (έτοιμο για χρήση) σε ρωγμές και χαραμάδες. Δόση εφαρμογής:

- Η τοποθέτηση του δολώματος πρέπει να πραγματοποιείται στα σημεία ή κοντά στα σημεία όπου συγκεντρώνονται οι κατσαρίδες, όπως ρωγμές ή σχισμές.

Το προϊόν εφαρμόζεται σε σταγόνες του 0,1γρ., όπου η κάθε σταγόνα περιέχει 0,002γρ. dinotefuran σύμφωνα με τα παρακάτω:

- 2-4 σταγόνες /m2 για τα μικρά είδη κατσαριδών (*Blattella germanica*)

- 4-8 σταγόνες/ m2 για τα μεγάλα είδη κατσαριδών (*Blattella orientalis*)

- Σε υψηλές προσβολές εφαρμόστε κατά μέγιστο 0,8γρ. προϊόντος/m2 και μην ξεπερνάτε τις παρακάτω δοσολογίες:

- Έως και 16 σταγόνες συνολικά για ένα σπίτι

- Έως και 72 σταγόνες συνολικά για δημόσια κτίρια.

Σε περίπτωση υψηλής προσβολής, μπορεί να πραγματοποιηθεί και μια δεύτερη εφαρμογή μετά από 7 ημέρες.

Κατηγορία (ες) χρηστών: Επαγγελματίες χρήστες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Οδηγίες χρήσης: Για να εφαρμόσετε το gel, αφαιρέστε το καπάκι από το ακροφύσιο, ακουμπήστε τη μύτη του ακροφυσίου στην επιφάνεια όπου θα κάνετε εφαρμογή και πιέστε απαλά το έμβολο.

Επαναλάβετε την εφαρμογή ανάλογα με το επίπεδο της παραμένουσας προσβολής και όταν το δόλωμα δεν είναι πλέον ορατό. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και αποθηκεύστε το προϊόν.

Εφαρμογή με τη μέθοδο της σταγόνας: Αφαιρέστε το καπάκι από το σωληνάριο εφαρμογής. Ακουμπήστε την άκρη στο σημείο εφαρμογής. Πιέστε το έμβολο όσο χρειάζεται ώστε να εξέλθει η κατάλληλη ποσότητα. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι μετά το τέλος της εφαρμογής.

Μέθοδος εφαρμογής σε ρωγμές και σχισμές: Το δόλωμα πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας στις ρωγμές και στις σχισμές όπου κρύβονται τα έντομα. Τοποθετήστε το άκρο το σωληναρίου απευθείας στις ρωγμές και στις σχισμές και εφαρμόστε το gel. Το δόλωμα θα πρέπει να τοποθετείται εντός του κενού και όχι σε ανοιχτές ή εκτεθειμένες επιφάνειες.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

Για χρήση μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα σε παιδιά και ζώα.

Μην το χρησιμοποιείτε εκεί όπου μπορεί να μολυνθούν τρόφιμα ή νερό.

Να πλένετε τα χέρια σας και το δέρμα που εκτέ

πριν από το φαγητό και μετά από κάθε χρήση.

Να φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην το εφαρμόζετε κοντά ή μέσα σε αποχετεύσ

Μη το εφαρμόζετε σε περιοχές όπου τα παιδιά

κατοικούν έχουν εύκολη πρόσβαση.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης: P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501

Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ Ή ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αναζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Προκαλέστε εμετό με την καθοδήγηση ιατρικού προσωπικού. Μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο με σπασμούς ή που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Εισπνοή: Σε περίπτωση αδιαθεσίας, μετακινήστε τον πάσχοντα αμέσως στον καθαρό αέρα. Εάν ο βήχας ή άλλα συμπτώματα επιμένουν, απευθυνθείτε σε έναν γιατρό. Εάν δεν μπορεί να αναπνεύσει, καταφύγετε στην τεχνητή αναπνοή. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, να παρασχετε οξυγόνο.

Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, απευθυνθείτε σε έναν γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ανασηκώστε τα βλέφαρα με τα δάχτυλα για καλύτερο καθαρισμό. Ελέγξτε και βγάλτε τους φακούς επαφής εάν είναι εύκολο. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, απευθυνθείτε σε έναν γιατρό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Επείγοντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Προστασία του περιβάλλοντος: Μην αφήσετε αυτό το προϊόν να εισχωρήσει στο περιβάλλον.

"Ελεγχος χυμένης ποσότητας: Σκουπίστε ή σφουγγαρίστε το χυμένο προϊόν και τοποθετήστε το σε έναν ειδικό κάδο διάθεσης.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία. Ότι δεν μπορεί να ανακτηθεί μπορεί να αποτεφρωθεί σε έναν εγκεκριμένο αποτεφρωτήρα ή να τοποθετηθεί σε έναν ειδικό κάδο διάθεσης. Ατομική προστασία: Να φοράτε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ:

ΜΗΝ ρυπαίνετε ρυάκια, ποτάμια ή υδάτινες οδούς με το προϊόν ή με τη χρησιμοποιημένη συσκευασία του. Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία. Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. ΜΗΝ το αποθηκεύσετε στο άμεσο ηλιακό φως. Προστατεύστε το από τον παγετό. Η διάρκεια ζωής στην αποθήκη είναι 2 έτη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: KY-0152

Κάτοχος της άδειας:

QUIMICA DE MUNGUIA S.A.

Derio Bidea 51, 48100 Munguia, Ισπανία

Παρασκευαστής του προϊόντος – δραστηκής ουσίας:

Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc. Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo, Ιαπωνία.

