



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021  
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 5355 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 04/06/2026, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **BENTA 480SL** ως ακολούθως:

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

3946

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/05/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/10/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

**Sharda CropChem España S.L.**  
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
3006 Murcia, Ισπανία

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:  
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον  
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

## Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Benta 480SL

2. Μορφή: Πυκνό Διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Bentazone 48 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 58,91 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROPChem LIMITED, Ινδία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Chemark Kft  
2. Zaklady Chemiczne Organika-Sarzyna" S.A.  
3. Safapack Ltd.  
4. I.R.C.A. Services S.P.A.  
5. Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd.  
6. Changzhou Henglong Chemical Co. Ltd.  
7. NITROFARM A.E.,

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. Chemark Kft  
2. Zaklady Chemiczne Organika-Sarzyna" S.A.  
3. Safapack Ltd.  
4. I.R.C.A. Services S.P.A.  
5. Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd.  
6. Changzhou Henglong Chemical Co. Ltd.  
7. NITROFARM A.E.,

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

| A/A | Είδος  | Μέγεθος                                               | Υλικό |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Φιάλες | 50 κ.εκ., 100 κ.εκ., 250 κ.εκ.,<br>500 κ.εκ., 1 λίτρο | HDPE  |
| 2.  | Δοχεία | 5, 10, 20 λίτρα                                       | HDPE  |

## Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Bentazone

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5 % β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Sharda Cropchem Ltd., Ινδία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd.

#### Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

##### 1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το BENTA 480 SL είναι ένα διαλυτό συμπυκνωμένο σκεύασμα για χρήση ως ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε καλλιέργειες αραβόσιτου και ρυζιού για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων.  
Το BENTA 480 SL περιέχει bentazone ως δραστικό συστατικό.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες  
ερασιτέχνες χρήστες



##### 3. Τρόπος Εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων

##### 4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

##### **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Στόχος                                                                                                                                                                                                                          | Δόσεις                          |                    | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής                                                                                       | Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) | Κ.εκ./δεκ. μέγιστη |                                                                                                                   |                                            |
| Αραβόσιτος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Πλατύφυλλα Ζιζάνια</b><br><br>Ευαίσθητα πλατύφυλλα:<br>Αγριοπιπεριά ( <i>Polygonum persicaria</i> )<br>Τραχύ βλήτο ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) (στο ρύζι)<br>Σκίρπο ( <i>Scirpus spp.</i> )                            | 15 – 40                         | 200                | Εφαρμόζεται νωρίς μεταφωτρωτικά όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-5 πραγματικών φύλλων. (BBCH 10-15)      | 1                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ρύζι</b><br><br>Μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα:<br>Τραχύ βλήτο ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ), (στον αραβόσιτο)<br>Πεντάνευρο ( <i>Alisma plantago aquatica</i> )<br><i>Bidens spp</i><br>Στύφνος ( <i>Solanum nigrum</i> ) | 30 – 50                         | 200                | Εφαρμόζεται μεταφωτρωτικά από το 3 <sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειας έως το τέλος του αδελφώματος. (BBCH 13-29) | 1                                          |
| <b>Παρατηρήσεις:</b><br>1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα τηγάνια ως 2-3 εκ. και να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό.<br>2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων. |                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                    |                                                                                                                   |                                            |

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες     | Χρόνος Ασφάλειας                      |
|------------------|---------------------------------------|
| Αραβόσιτος, ρύζι | M.E (Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής) |

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: C3**

Για να αποτρέψετε ή να καθυστερήσετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ζιζανίων, εναλλάσσετε την εφαρμογή του εν λόγω ζιζανιοκτόνου με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και υιοθετήστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές ελέγχου των ζιζανίων, όπως η αμειψισπορά, οι μέθοδοι μηχανικής καταπολέμησης κ.λπ. Πρέπει να εφαρμόζονται τακτικές εκτιμήσεις για την παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου κάθε πιθανής εξέλιξης της ευαισθησίας των ζιζανίων στο BENTA 480 SL και να ενημερώνονται οι αρμόδιες τοπικές αρχές. Για να αποφύγετε δυσμενείς επιπτώσεις στις καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε παρακείμενες περιοχές, μην ψεκάζετε το προϊόν σε συνθήκες ανέμου και χρησιμοποιήστε ακροφύσια που μειώνουν τη μετατόπιση

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις

10. Συνδυαστικότητα:

---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

## 12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**H412** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208** Περιέχει Bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

## 13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

**P264** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280** Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.

Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση καθώς και κατά την εφαρμογή.

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Sp1** Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**Spe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή αφήστε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% από μη γεωργική γη.

## 14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

**P301+P312:** Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

**Σε περίπτωση εισπνοής επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**

## Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

## ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: ...04/09/2026.....



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης  
Διευθυντής  
Τμήματος Γεωργίας