



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 1092 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 06/02/2026, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής των δραστικών ουσιών boscalid και pyraclostrobin και την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BISCONE 26.7/6.7 WG..... ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4235

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

10/07/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/04/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A
4818 CP Breda, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

BISCONE 26.7/6.7 WG

2. Μορφή:

Εναιωρηματοποιησιμοί Κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

1. Boscalid 26.7 % (β/β)

2. Pyraclostrobin 6.7 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 65.78 % (β/β)

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL Europe Ltd

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Cerexagri (UPL group) Bassens, Γαλλία
3. Cerexagri (UPL group) Le Canet, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group) Mourenx, Γαλλία
5. Superform Chemicals Ltd. (UPL group) 117/118, Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemicals Ltd. (UPL group) 3405/6, Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd. (UPL group) 3101/2, Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemicals Ltd. (UPL group) Vapi, Gujarat, Ινδία
09. Superform Chemicals Ltd. (UPL group) Jhagadia, Gujarat, Ινδία
10. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl, Ougrée, Βέλγιο
11. Arysta LifeScience SAS (UPL group), Nogueres, Γαλλία
12. Laoting Yooloo Bio-Technology Co. Ltd., Κίνα
13. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd., Shandong Province, Κίνα

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Cerexagri (UPL group) Bassens, Γαλλία
3. Cerexagri (UPL group) Le Canet, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group) Mourenx, Γαλλία
5. Superform Chemicals Ltd. (UPL group) 117/118, Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemicals Ltd. (UPL group) 3405/6, Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd. (UPL group) 3101/2, Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)

Vapi, Gujarat, Ινδία
 9. Superform Chemicals Ltd. (UPL group)
 Jhagadia, Gujarat, Ινδία
 10. Arysta LifeScience Ougrée Production
 Sprl, Ougrée, Βέλγιο
 11. Arysta LifeScience SAS (UPL group),
 Nogueres, Γαλλία
 12. Laoting Yolo Bio-Technology Co. Ltd.,
 Κίνα
 13. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,
 Ltd., Shandong Province, Κίνα
 14. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ελλάδα
 15. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε., Ελλάδα
 16. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, Ελλάδα
 17. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ, Ελλάδα
 18. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd., Κύπρος

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	300 γρ., 500 γρ., 1 κιλό	HDPE, f-HDPE
2	Μπιτόνι	2.5 κιλά, 5 κιλά	HDPE, f-HDPE

Γ) i. Δραστική ουσία 1

1. Κοινή Ονομασία: Boscalid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
 ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

96 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. UPL Europe Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο
 2. Hebei Lansheng Biotech Co. Ltd., Κίνα
 3. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,
 Shandong, Κίνα

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. UPL Limited., Ινδία
 2. Hebei Lansheng Biotech Co. Ltd., Κίνα
 3. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,
 Shandong, Κίνα

ii. Δραστική ουσία 2

1. Κοινή Ονομασία:

Pyraclostrobin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97.5 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Shandong Hailir Chemical Co., Ltd., Κίνα
2. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,
Shandong, Κίνα

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

1. Shandong Hailir Chemical Co., Ltd., Κίνα
2. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.,
Shandong, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα. / δεκ.)	γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./δεκ. (μέγιστη)		
Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO	Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i> MONILA)	100	60-75	60-75	Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών. (BBCH 60-69 & 77-81)	3 / 7-14 ημέρες
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA)		60	60		
Κερασιά PRNAV	Μονίλια (<i>Monilinia laxa</i> MONILA)	100	60-75	60-75	Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων. (BBCH 60-71)	3 / 7-10 ημέρες
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA)		60	60		
Φράουλα* (Θερμοκηπίου) FRAAN	Βοτρυτίς (<i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI)	100	135-150	135-150	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 61-89)	3 / 5-7 ημέρες
	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i> SPHRMA)		75-100	75-100		
Καρότο* (Υπαίθρου) DAUCA	Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE)	80	100	60-80	Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος (BBCH 41-48)	2 / 10-14 ημέρες
	Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i> ALTEDA)		75			
Τομάτα* (Υπαίθρου &	Βοτρυτίς (<i>Botrytis cinerea</i>	100	100-150	100-150	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των	3 / 7-10 ημέρες

Θερμοκηπίου) LYPES Πιπεριά* (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) CPSAN	BOTRCI) Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> LEVETA)				πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής. (BBCH 10-89)	
Μαρούλι* (Υπαίθρου) LACSA	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> SCLESC)	50	120-150	60-75	Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας (BBCH 33-47)	2 / 7-10 ημέρες
Σπαράγγι ASPOF	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i> PUCCAS)	100	75-100	75-100	Από την έναρξη της άνθισης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος (BBCH 51-91)	2 / 10-15 ημέρες
Κρεμμύδι (Υπαίθρου) ALLCE Σκόρδο (Υπαίθρου) ALLSA	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI) Περωνόσπορος (<i>Peronospora</i> <i>destructor</i> PERODE)	100	150	150	Από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους. (BBCH 41-48)	2 / 10-14 ημέρες
Αμυγδαλιά PRNDU	Μονίλια (<i>Monilia</i> spp. MONISP) Εξώσκος (<i>Taphrina deformans</i> TAPHDE)	100-150	67-100	100	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 61-79)	2 / 10-15 ημέρες
Φιστικιά PIAVE	Καμαροσπόριο (<i>Botryosphaeria</i> <i>dothidea</i> BOTSDO)	100-150	50-100	75-100	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 61-79)	2 / 10-15 ημέρες

Κουκιά (φρέσκα) (Υπαίθρου) VICFX Φασόλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υπαίθρου) PHSVX	Βοτρυτής (<i>Botrytis</i> spp. BOTRSP), Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> spp. SCLESP) Σκωρίαση (<i>Uromyces</i> spp. UROMSP)	40-100	100-385	100-150	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης. (BBCH 15-89)	2 / 10 ημέρες
	Ασκοχύτωση (<i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI) Ωίδιο (<i>Erysiphe</i> spp. ERYSSP) Περονόσπορος (<i>Peronospora</i> spp. PEROSP) Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> spp. SCLESP)				Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 15-89)	
Σπανάκι SPCOL	Ανθράκωση (<i>Colletotrichum</i> sp. COLLSP) Περονόσπορος (<i>Peronospora</i> sp. PEROSP) Κλαδοσπόριο (<i>Cladosporium</i> sp. CLADSP)	40-100	75-250	75-100	Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} φύλλου, μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος (BBCH 14-49)	2 / 7-10 ημέρες
Αρωματικά Φυτά: - Βασιλικός (Θερμοκηπίου) OCIBA	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> spp. SCLESP) Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI)	40-100	150-375	150	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου, μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φύλλων του φυτού. (BBCH 15-47)	2 / 10 ημέρες
Καλλωπιστικά: - Τριαντάφυλλο	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca</i>	40-100	150-375	80-150	Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου,	2 / 10 ημέρες

(Θερμοκηπίου) ROSS	<i>rannosa</i> SPHRPA)					μέχρι το τέλος της άνθισης. (BBCH 13-69)	
Παρατηρήσεις: * Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση. 1. Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθeneιών. 2. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.							

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμυγδαλιά, Φιστικά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Μαρούλι (Υ), Κουκιά (φρέσκα) (Υ), Φασόλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ), Μπιζέλια με λοβό και χωρίς λοβό - φρέσκα	7 ημέρες
Καρότο (Υ), Κρεμμύδι (Υ), Σκόρδο (Υ), Σπανάκι, Βασιλικός (Θ)	14 ημέρες
Φράουλα (Θ), Τομάτα (Υ + Θ), Πιπεριά (Υ + Θ)	3 ημέρες
Σπαράγγι (Υ)	Μη εφαρμόσιμο (>120 ημέρες)
Τριαντάφυλλο (Θ)	Μη εφαρμόσιμο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα τρόπου δράσης - FRAC: boscalid: 7
Pyraclostrobin: 11**

- Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με προϊόντα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια

στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

--

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις Κυπριακές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

10. Συνδυαστικότητα:

--

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H410: Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια».

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία (μακρύ παντελόνι, μπλούζα με μακριά μανίκια) και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** ή **15 μέτρων** με ακροφύσια μειωμένης διασποράς (**75%**) από τα επιφανειακά ύδατα για την αμυγδαλιά και τη φιστικιά, **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τα ψυχανθή και **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.

P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν

υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντληση των αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα.
2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 10/07/2026



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας