

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδένοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυθίου και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΡΑΒΩΣΤΙΣ: για *Πλατύφυλλα ζιζάνια με μέγιστη δόση 200κ.εκ./δεκάριο και όγκο ψεκαστικού υγρού 15-40 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμόζεται χωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-5 πραγματικών φύλλων. (BBCH 10-15). Μια (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΡΥΖΙ: για *Πλατύφυλλα ζιζάνια με μέγιστη δόση 200κ.εκ./δεκάριο και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-50 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το 3^ο φύλλο της καλλιέργειας έως το τέλος του αβελφώματος. (BBCH 13-29). Μια (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

***Πλατύφυλλα ζιζάνια: Ευαίσθητα πλατύφυλλα:** Αγριοσιταριά (*Polygonum persicaria*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* στο ρύζι), Σκίρπο (*Scirpus* spp.), **Μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα:** Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* στον αραβόσιτο), Πεντάνευρο (*Alisma plantago aquatica*), *Bidens* spp., Ξυφών (*Solanum nigrum*).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα πηγάδια ως 2-3 εκ. και να διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που και το χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό. 2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Αραβόσιτος, Ρύζι: Μ.Ε. (ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: C3

Για να αποτρέψετε ή να καθυστερήσετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ζιζανίων, εναλλάσσετε την εφαρμογή του εν λόγω ζιζανιοκτόνου με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και υιοθετείτε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές ελέγχου των ζιζανίων, όπως η αμειψισπορά, οι μέθοδοι μηχανικής καταπολέμησης κ.λπ. Πρέπει να εφαρμόζονται τακτικές εκτιμήσεις για την παρακολούθηση με την πάροδο του χρόνου κάθε πιθανής εξέλιξης της ευαισθησίας των ζιζανίων στο BENTA 480 SL και να ενημερώνονται οι αρμόδιες τοπικές αρχές.

Για να αποφευχθεί δυσμενής επίπτωσης στις καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε παρακείμενες περιοχές, μην ψεκάζετε το προϊόν σε συνθήκες ανέμου και χρησιμοποιήστε ακροφύσια που μειώνουν τη μετατόπιση.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, βροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τριψήφια, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποδοθεύονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΗΣΕΩΝ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλα παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμότητά του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν απωτίσεις. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

BENTA 480SL

ZIZANIOKTONO

Το BENTA 480 SL
είναι ένα διαλυτό
συμπυκνωμένο
σκεύασμα για χρήση
ως ζιζανιοκτόνο για
μεταφυτρωτική
εφαρμογή
σε καλλιέργειες
αραβόσιτου και ρυζιού
για τον έλεγχο των
πλατύφυλλων ζιζανίων.

Το BENTA 480 SL περιέχει
bentazone ως δραστικό
συστατικό.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Αρ. Άδειας: 3946

Εγγυημένη σύνθεση:
Bentazone 48 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 58,91 % β/β

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Κάτοχος Άδειας:
Sharda Cropchem España,
S.L., Ισπανία

Διανομέας:
Premier Shukuroglou
Cyprus Ltd
TnA. 22 81 53 53, Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

1lt



Premier
Shukuroglou

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P264** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τη χειριρμό. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία. Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση καθώς και κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι, εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρίστες επιφάνειες και τους δρόμους.

Sp3 Για να προστατέψετε το φυτό μη στάκαυς χρησιμοποιήσατε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% από μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401



ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUN208 Πιέριεξ Bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUN401 Για να αποφευχθεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

σκαυθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: A3J0-GKX6-220A-5CCM

Αρ. Παρτίδας (Batch No) &
Ημ. Παραγωγής (Man. Date):
Βλέπετε συσκευασία



5 290770 1007759

L/BENTA48SL/1LT/CY/2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ
ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Green Dot
Κύπρου

