ΚΥΠΡΙΑΚΗ **ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(Ι)/2011 και Ν 71(Ι)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 1151 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 11/05/2026, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας,
- την αίτηση με αρ. 5450 (Έντυπο 08), ημερομηνίας 30/09/2026, για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SACRON 45WG ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας: 3796

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας: 23/10/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας: 30/11/2028

2. Κάτοχος της άδειας: UPL Holdings Coöperatief U.A Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας) Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς: Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Sacron 45WG

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:
Cymoxanil: 45 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 54,10 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: UPL Europe Ltd

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Cerexagri (UPL group) Bassens, Γαλλία
3. Cerexagri (UPL group), Le Canet, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group) Mourenx, Γαλλία
5. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 117, 118 Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3405/6, Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd. (UPL group), 3101/1,2,3, Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) Vapi, Gujarat, Ινδία
9. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) Plot No 746/750, Gujarat, Ινδία
10. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group), Ougrée, Βέλγιο
11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group), Noguères, Γαλλία
12. STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA), Ιταλία
13. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd, Hebei, Κίνα
14. UPL Ltd. (UPL group) Plot No. D/2/CH/150, Dahej-II, Gujarat, Ινδία
15. UPL Ltd. (UPL group) 3210/3201/A, Ankleshwar, Ινδία
16. Superform Chemistries Limited (UPL group) Taluka Halol, Gujarat, Ινδία
17. UPL Ltd. (UPL group), Jammu & Kashmir, Ινδία
18. Superform Chemistries Limited (UPL group) Haldia West Bengal, Ινδία
19. Arysta Lifescience India Limited (UPL Group) 50 A, G.I.D.C., Kalol, Gujarat, Ινδία
20. Arysta Lifescience India Limited EOU-Unit II, Kalol, Gujarat, Ινδία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. UPL Europe Ltd., Sandbach, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Cerexagri (UPL group) Bassens, Γαλλία
3. Cerexagri (UPL group), Le Canet, Γαλλία
4. Cerexagri (UPL group) Mourenx, Γαλλία
5. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 117, 118 Ankleshwar, Ινδία
6. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3405/6, Ankleshwar, Ινδία
7. UPL Ltd. (UPL group), 3101/1,2,3, Ankleshwar, Ινδία
8. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) Vapi, Gujarat, Ινδία
9. Superform Chemistries Ltd. (UPL group) Plot No 746/750, Gujarat, Ινδία
10. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl (UPL group), Ougrée, Βέλγιο
11. Arysta LifeScience S.A.S. (UPL group), Noguères, Γαλλία
12. STI Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA), Ιταλία

13. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd, Hebei, Κίνα
14. UPL Ltd. (UPL group) Plot No. D/2/CH/150, Dahej-II, Gujarat, Ινδία
15. UPL Ltd. (UPL group) 3210/3201/A, Ankleshwar, Ινδία
16. Superform Chemistries Limited (UPL group) Taluka Halol, Gujarat, Ινδία
17. UPL Ltd. (UPL group), Jammu & Kashmir, Ινδία
18. Superform Chemistries Limited (UPL group) Haldia West Bengal, Ινδία
19. Arysta Lifescience India Limited (UPL Group) 50 A, G.I.D.C., Kalol, Gujarat, Ινδία
20. Arysta Lifescience India Limited, EOU-Unit II, Kalol, Gujarat, Ινδία
21. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
22. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ 80ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο Βοιωτίας
23. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
24. K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
25. Τεχνοφάρμ Νέα Σάντα, 61100, Κιλκίς
26. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd, Κύπρος

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακίδιο /σακούλα μέσα σε κουτί	25, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500 ,600 , 800 γρ., 1, 1,5 , 2 και 2,5 κιλών	Κουτί από χαρτόνι Σακίδιο /σακούλα από PE ή AL ή σύνθετο υλικό με εσωτερική επίστρωση PE (PET/AL/PE)
2.	Σακίδιο /σακούλα	50 γρ.,, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 , 800 γρ., 1, 1,5 , 2 και 2,5 κιλών	PE ή AL ή σύνθετο υλικό με εσωτερική επίστρωση PE (PET/AL/PE)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Cymoxanil

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:
1. UPL Europe Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
2. India Pesticides Ltd., (IPL), Ινδία
3. Arysta LifeScience Benelux SRL, Βέλγιο

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:
1. UPL LIMITED, Ινδία
2. India Pesticides Ltd. (IPL), Ινδία
3. Shaanxi Hengtian Biological Agriculture Co., Ltd., Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Μυκητοκτόνο τοπικά διασυστηματικό (διεισδυτικό) και επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε αμπέλι, πατάτα και τομάτα υπαίθρου. Δρα ανασταλτικά στη δημιουργία σπορίων από τον μύκητα.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες [√]
ερασιτέχνες χρήστες [ ]

3. Τρόπος Εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, ρίξτε το στο ψεκαστικό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά. Συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. **Καθαρισμός ψεκαστήρα**: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό έως ότου ο αφρός και όλα τα ίχνη του σκευάσματος έχουν απομακρυνθεί.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	γρ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες & επιτραπέζιες ποικιλίες)	**Περονόσπορος** (*Plasmopara viticola*)	27 – 54	50 – 100	27	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 3 φύλλων όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13- 85).	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Πατάτα	**Περονόσπορος** (*Phytophthora infestans*)	22 – 44		22	Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 21- 95)	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου – επιτραπέζιες ποικιλίες)	**Περονόσπορος** (*Phytophthora infestans*)	27 -54		27	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο του τρίτου πραγματικού φύλου και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13 - 87)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου - βιομηχανικές ποικιλίες)	**Περονόσπορος** (*Phytophthora infestans*)	27 – 54		27	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο του τρίτου πραγματικού φύλου και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13 - 85)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1.Να χρησιμοποιείται **πάντα** σε ανάμιξη με προστατευτικά μυκητοκτόνα επαφής διαφορετικού τρόπου δράσης (π.χ. mancozeb, folpet, copper κ.λπ.).

2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

3. Να αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια.

4. Προσαρμόστε τις δόσεις ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά δεκάριο.

5. Πριν από κάθε εφαρμογή να συμβουλεύεστε τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε αναμιγνυόμενου προστατευτικού μυκητοκτόνου και να συμμορφώνεστε με τη συνιστώμενη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Αμπέλι	28 ημέρες
Πατάτα	7 ημέρες
Τομάτα υπαίθρου	3 ημέρες
Τομάτα βιομηχανική	10 ημέρες.

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 27

- Για αποτροπή ανάπτυξης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας αλλά και για επιμήκυνση της διάρκειας προστασίας λόγω της συνεργιστικής του δράσης συνιστάται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να εφαρμόζεται σε ανάμιξη ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Να μην εφαρμόζεται αν το φύλλωμα είναι υγρό (μετά από άρδευση ή βροχή) ή αν αναμένεται βροχή ή παγετός αμέσως μετά τον ψεκασμό ή αν τα φυτά είναι σοκαρισμένα.
- Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις εφαρμογής και σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

10. Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται, ανεξάρτητα με τη σειρά προσθήκης στο ψεκαστικό διάλυμα, με προστατευτικά μυκητοκτόνα σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης (mancozeb, maneb, βο
ρδιγάλειο πολτό, folpet κ.α.) Σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούνται οι εγκεκριμένες για κάθε σκεύασμα δόσεις ανά καλλιέργεια/ασθένεια.

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (μάτια, αίμα, θύμο αδένα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH 208 Περιέχει maleic acid, potassium salt, cymoxanil (ISO). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
***EUH* 401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει: *Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts; cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide.*

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
P264 Πλένετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
P301+P330+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπωματική.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, σε κανονική θερμοκρασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες/κουτιά), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντλησης αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα. 2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια. 3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 23/10/2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΒΙΟΤΟΠΩΝ
ΚΥΠΡΟΣ

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα