ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια, προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά ή αμέσως μετά την μεταφύτευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν την έναρξη του ψεκασμού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά), **Μπλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά), **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά), **Αμπέλι με δόση** 187,5 κ.εκ./δεκ.Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμόζεται ανάμεσα στις γραμμές προφυτρωτικά επιφανειακά. **1 εφαρμογή.**
Μπρόκολο, Λάχανο με δόση 250 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή: α) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, β) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. **1 εφαρμογή.**
Κουνουπίδι, Μαρούλι με δόση 375 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή: α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά, γ) αμέσως μετά τη μεταφύτευση. **1 εφαρμογή.**
Ραδίκι με δόση 375 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο. **1 εφαρμογή.**
Αντίδι με δόση 375 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή: α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά. **1 εφαρμογή.**
Φασολάκια νωπά, Φακή, Ηλίανθος με δόση 187,5 κ.εκ.σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή: α) προσπαρτικά με ενσωμάτωση, β) μετασπαρτικά προφυτρωτικά επιφανειακά. **1 εφαρμογή.**
Αγκινάρα, Άγρια αγκινάρα με δόση 375 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά στην έναρξη ανάπτυξης βλαστού. **1 εφαρμογή.**
Ελαιοκράμβη με δόση 187,5 κ.εκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή μετά το στάδιο των 2–4 φύλλων. **1 εφαρμογή.**
Καλλωπιστικά (Δένδρα και θάμνοι) με δόση 375 κ.εκ./δεκ.Όγκος ψεκ. υγρού 20–40 λίτρα/δεκ. Εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης ή στο 50% της επιφάνειας του εδάφους. **1 εφαρμογή.**
Ζιζάνια που ελέγχονται:
Πλατύφυλλα: Κουσκούτα *(Cuscuta spp.)*, Πολυκόμπι *(Polygonum aviculare)*, Αγριοπιπεριά *(P. persicaria)*, Λουβουδιά *(Chenopodium album)*, Βερόνικα *(Veronica spp.)*, Αντράκλα *(Portulaca oleracea)*.
Αγρωστώδη: Αλεπονουρά *(Alopecurus myosuroides)*, Μουχρίτσα *(Echinochloa crus-galli)*, Κοινή πόα *(Poa annua)*.
Παρατηρήσεις:
1. Στα φυλλώδη λαχανικά για την καλύτερη καταπολέμηση της κουσκούτας, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως τα 500 κ.εκ./δεκάριο.
2. Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος KERB FLO 400 SC.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Ακρόδρυα, Μπλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι, Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη, Ραδίκι, Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι: Μη Εφαρμόσιμο.
Μαρούλι, Αντίδι: 28 ημέρες.
Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Αγκινάρα: 60 ημέρες.
Φασολάκια νωπά, Φακή: 90 ημέρες.
Άγρια αγκινάρα: 120 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: K1

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
- Αγκινάρες, ραδίκι, μαρούλι, σκαρόλα: κανένα.
- Ψυχανθή, καλαμπόκι, σόργο, καρότο, πατάτα, σέλινο, φράουλα, βαμβάκι: 5 μήνες.
- Ζαχαρότευτλα, σπανάκι, κολοκυνθοειδή, λάχανο, ελαιοκράμβη, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα: 8 μήνες.
- Σιτηρά, αγρωστώδη για βοσκή, γρασίδια: 12 μήνες.

Το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί KERB FLO 400SC πρέπει να οργωθεί σε βάθος 15 εκ. πριν να σπαρεί με σιτηρά, αγρωστώδη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια που δεν αναφέρεται παραπάνω.
Οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μέγιστοι που απαιτούνται. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να μειωθεί σε θερμά κλίματα καθώς και όταν χρησιμοποιούνται οι χαμηλές δόσεις εφαρμογής.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:
Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:—

CORTEVA™ agriscience

Kerb™ FLO 400SC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται αποπλαστικά. Η ζιζανιοκτόνος δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση του πολυμερισμού της τουμπουλίνης με αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης του ριζικού συστήματος.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αρ. Άδειας: 4098-P

Εγγυημένη σύνθεση:
Propyzamide 40 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 61,85 % β/β

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Παρασκευαστής:
Corteva Agriscience International Sarl, Switzerland

Κάτοχος της Άδειας – Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22815353
Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Premier Shukuroglou

600ml

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
P302+P361+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P304+P340+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P305+P351+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
P301+P330+P331+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401



ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: SA49-501V-500M-RS2J

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **EUH208** Περιέχει 2-νοφθαλινοσουλφονικό οξύ, 6-υδροξυ-,πολυμερές με φορμαλδεΰδη και μεθυλοφαινόλη, άλας νατρίου και 1,2-βενζισοθειαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401 *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.*

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. **P270** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. **P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος με ψεκαστήρες πλάτης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

5 290770 006547

L/KERBFLO/600ML/CY/4

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΗΚΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Green Dot Κύπρου

™ ® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.