

PANTOX SUPER 360

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

glyphosate οξύ 36% β/ο

(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6 % β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 58,4 % β/β

Πυκνό διάλυμα (SL)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 3557

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 200-400 κυβικά εκατοστά για 10 τετραγωνικά μέτρα (20 έως 40 κυβικά εκατοστά για 1 τετραγωνικό μέτρο) και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μικρ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Να μην χρησιμοποιείτε καθαρό ή ακληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε τον ψεκαστήρα και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: (Πεδίο Εφαρμογής- Ζιζάνιο που ελέγχεται – Δόσεις – Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής – Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο) **ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΟΠΩΣ: ΞΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κίτριά), **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά), **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδάκινια, Κερασιά), **ΑΜΠΕΛΙΑ** (επιτραπέζια και οινοπoiήσιμα), **ΕΛΙΕΣ: - Για Ετήσια Ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα), μέγιστη δόση** 2 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού.

Για **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.), **Πολυκόμψι** (*Polygonum* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **μέγιστη δόση** 6 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού. Δύο **(2) εφαρμογές** με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

- Για Πολυετή Ζιζάνια ()** με **μέγιστη δόση** 10 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού.

Για **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*), **μέγιστη δόση** 5 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού. Για **Βέλιουρα** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*), **Περικοκλάδα** (*Convolvulus arvensis*), **Κίρσιο** (*Cirsium arvense*), **μέγιστη δόση** 10 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού. Μία **(1) εφαρμογή** με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

Για **Κύπερη** (*Cyperus* sp.),δύο **(2) εφαρμογές** 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με μέγιστη δόση 6 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού και 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με μέγιστη δόση 5 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΠΟΡΑ Ή ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΦΥΤΑ:

- Για Ετήσια Ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα), μέγιστη δόση 2 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού.

Για **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.), **Πολυκόμψι** (*Polygonum* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **μέγιστη δόση** 6 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού. Μία **(1) εφαρμογή** με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης.

- Για Πολυετή Ζιζάνια ()** με **μέγιστη δόση** 10 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού .

Για **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*), **μέγιστη δόση** 5 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού. Για **Βέλιουρα** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*), **Περικοκλάδα** (*Convolvulus arvensis*), **Κίρσιο** (*Cirsium arvense*), **μέγιστη δόση** 10 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού. Μία **(1) εφαρμογή** με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

Για **Κύπερη** (*Cyperus* sp.),δύο **(2) εφαρμογές** 1η εφαρμογή κατά την άνθηση με μέγιστη δόση 6 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 15 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού και 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με μέγιστη δόση 5 κ.εκ.σκ./10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 12,5 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού.

- Ξυλώδεις θάμνοι, βάτα (*Rubus* sp.), **μέγιστη δόση** 10 κ.εκ.σκ./ 10 τετραγωνικά μέτρα και Όγκο 25 κ.εκ./1 λίτρο ψεκαστικού υγρού. Μία **(1) εφαρμογή** όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. **(**)** Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

Παρατηρήσεις: 1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. . **2.** Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* spp. (μολόχες), *Urtica* spp. (τσουκνίδες), *Polygonum* spp. (πολυκόμψι, λαπάτσα), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 4-6 κυβ. εκ. ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. **3.** Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά. **4.** Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλωμα της κορυφής. **5.** Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. **6.** Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. **7.** Να μη

χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. **8.** Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Όλες οι καλλιέργειες: 7 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:*Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: G.*

- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.

Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήσεις: - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. - Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. - Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση. - Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο σε νεροχύτες ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα γεώτρηση. - Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν. Να μην επιτρέπεται η είσοδος στα ζώα για τις επόμενες 21 μέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να εφαρμόζεται μόνο του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P102Μακριά από παιδιά. **P405**Φυλάσσεται κλειδωμένο. **P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. **Spe3** Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

P305+P351+P338ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατρόπινης και οξίμης δεν ενδεδικνται.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στον ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος ως όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσμευτικές αλλά βασίζονται στις πιστοπράστες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ύπαρξη ανθεκτικότητας, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοπιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:

UPL Ελλάς Α.Ε.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Τηλ. 22815353 – Λευκωσία

www.premier.com.cy